

دراسة كيميائية لبعض أنواع وأجناس العائلة الريبيعة (Primulaceae) النامية في العراق.

أ.د. عبد الكريم خضرير البيرمانى * م. هدى جاسم محمد *

جامعة بابل/ كلية العلوم للبنات/ قسم علوم الحياة

* بحث مستقل من أطروحة دكتوراه للباحثة .

الخلاصة

تم التحري عن المحتوى الفينولي والفلافونويدي في المستخلصات الكحولية للأوراق والرؤوس الزهرية لأنواع وأجناس العائلة الريبيعة النامية في العراق. وقد فصلت المركبات الفلافونويدية باستعمال صفائح السليكا الرقيقة Thin Layer Chromatography (TLC) والمذيب n-Butanol: Acetic acid : Water (BAW) ، وصنفت تلك المركبات اعتماداً على قيمة Relative flow (Rf) ولون المركبات تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV) فضلاً عن بعض المصادر . بالإضافة إلى ذلك تم الكشف لونياً عن وجود المركبات الفينولية والقلوية والصابونية والتаниنية والايامودين باستخدام عدد من الكواشف وأيضاً قدرت كمية البروتين الكلية في تلك الأنواع.

Abstract

Flavonoid contents were investigated in Alcoholic extract of leaves and heads for genera and species of Primulaceae grown in Iraq. Flavonoids compounds were isolated by using Thin Layer Chromatography (TLC) and BAW solvent. These compounds were classified according to their Relative flow (Rf) value , color under Ultraviolet (UV) and some references. In addition Flavonoids, Alkaloids, Saponins, Tannins and Imodin compounds were detected by using some color indicated ; Total protein were also detected in these species.

المقدمة :Introduction

حظيت العائلة الريبيعة Primulaceae باهتمام خاص من الناحية الكيميائية لاسيما الأجناس التي لها أهمية طبية مثل الجنسين *Primula L.* و *Anagallis L.* ، إذ أشارت العديد من البحوث إلى المكونات الكيميائية لتلك الأجناس وأهميتها الطبية ومنها دراسة [1] الذي أعطى مسح شامل للمكونات الكيميائية ومنها الكاربوهيدرات التي تخزن في الأجزاء الترابية مثل الجذور والرایزومات ، والكاربوهيدرات الموجودة بشكل رئيس مثل Fructosans و Sedoheptulose و Mannose . أما الصابونيات Saponin فإنها تعد من الصفات المعتادة لهذه العائلة وربما تعلم عمل غذاء مخزون في جنس *Primula* . وبسبب صفات الصابونيات و Sapogenins المميزة للبلغم جعلت الكثير من العاملين يدرسون خصائص تلك المركبات من جديد، فهناك دراسة مقارنة لمحتويات Sapogenins لخمسة وحدات تصنيفية (Taxa) ضمن العائلة الريبيعة قام بها [2] ، تلتها دراسة [3] ليعطي صفات وطرق عمل لتقدير كمية Saponins وناقش التصنيف الكيميائي للعائلة وعلاقتها مع العائلة القرنفلية Caryophylaceae .

وفي عام 1978 أشار [4] إلى دراسة 82 نوعاً مختلفاً يعود للعائلة الريبيعة كيميائياً ووجد إن 6 أنواع من جنس *Primula* و 4 أنواع من أجنس آخر تحتوي على مادة تسبب التحسس تدعى Allergen Primin شخصت بطريقة Craven test بعد إن عُزل شخص لأول مرة من النوع *P.elatior* ومن بعض الأوراق التويجية للنوع *P.obconica* ، وأشارت النتائج إلى وجود تلك المادة مع بعض الأخرى التي تعلم مثل Quinones ولذلك ربما تكون هي المسؤولة عن التهاب الجلد التلامسي Allergens Dermatitis Allergenic Contact .
 تكون سامة على شكل Quinone إما أن تقرز من قبل الشعيرات الغذية أو أن ترسب تحت بشرة الورقة. كما وجدت دراسة مسبقة من قبل [6] تبين إن غسل اليدين المعرضة إلى أوراق الأنواع النباتية المسببة لـ Dermatitis بمحلول الأمونيا بتركيز 25% يمنع الالتهاب ولا يلاحظ أيضاً إن تقييع الأوراق النباتية في ذلك المحلول لمدة 24 ساعة فإنها تفقد قابليتها على الإصابة. لم تقتصر الدراسة الكيميائية على جنس *Primula* فقط وإنما شمل جنس *Anagallis* ، فحسب اعتقاد [7] إن المبدأ الأساسي الفعال للنوع *Anagallis arvensis* هو وجود الزيوت الطيارة اللاذعة والأنزيمات والصابونيات والتانينيات ومادة Primin وإن هذه الزيوت قد تسبب الآما في الرأس عند التعرض لها بمدة لا تقل عن 24 ساعة فتسبب التسمم للأغنام والكلاب والأرانب ومن علاماته الظمة والضعف والإسهال، فضلاً إلى ما أشار إلى [8] بان هذا النوع يحتوي على الصابونيات منها Anagallin والتانينات السامة للخلايا.

كما بين [9] إن المستخلص المائي لنبات *Anagallis arvensis* يستعمل في معالجة الفطريات الجلدية بنسبة تثبيط تقارب 90-100% بسبب وجود المركبات الفلافونوية مثل Narigenen و Neoporcirin وكلايكوسيدات فلافونويدية ومواد صابونية ثلاثة التربين Triterpenoid فضلاً عن Arvenins المسؤول لقتل تلك الفطريات.

وفيما يخص جنس *Lysimachia* ، فقد درس [10] النوع *L.davurica* وتم عزل وتشخيص 6 مركبات من المستخلص الكحولي للنبات الكامل بطريقة كرومتوغرافية العمود وهي Triacanthoic acid و Palmitic acid و Stigmasterol و β -amyrin و Benzoquinone Embelin و Soya-cerebroside و Oleanolic . فضلاً عن دراسة [11] لعزل مادتي *L.punctata* ضد الخلايا التائية للنوع *L.punctata* واثبت فعاليتها السمية ضد الخلايا

وباستعمال تقنية استخلاص السائل المضغوط قام [12] بعزل 5 مركبات فلافلونوبيريدية من النوع *L.clethroides* وهي Rutin و Isoquercitrin و Kaempferol-3-O-rutinoside و Isorhamnetin-3-O-rutinoside و Prunin مشيراً إلى الفعالية الباليلوجية لكل منها. وفي عام (2008) قام [13] بعزل 7 مركبات صابونية ثلاثة التربيعين باستعمال طريقة الرنين المغناطيسي Nuclear Magnetic Resonance (NMR) ومن النوع *L.christinae* وهي Lysichiside A , B و Primulanin . Ardisicrenoside و Lysikokianoside و Ardisiacrispin A و Anagallisin C .

ومن الدراسات الحديثة عن العائلة الربيعية دراسة [14] التي أشارت إلى أنواع وأجناس العائلة الربيعية تمتاز بوجود مادة (3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one) Kaempferol وهي مادة فلافلونوبيريدية صفراء اللون ذات وزن جزيئي 286 غ/مول و تستعمل في الطب الشعبي ، فقد أشارت العديد من الدراسات السريرية إلى أن مادة Kaempferol وبعض كلاريكوسيداتها لها معدل واسع في الفعاليات العفاقيرية منها مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والبكتيريا والسرطان والسكري.

وبالنظر لعدم وجود دراسة كيمائية تخص الأنواع الموجودة في العراق لذا كان الهدف منه التعرف على المواد الكيمائية لكل نوع ومعرفة مقدار درجة التقارب والتباين فيما بينها من ناحية السلم التطوري.

المواد وطرق العمل Materials and Methods

اعتمدت تقنية [15] للتحري عن المركبات فلافلونوبيريدية والفنولية في مستخلصات الأوراق والرؤوس الزهرية Heads للعينات المعشبية الجافة والمودعة في المعالشب العراقي لأنواع وأجناس العائلة الربيعية النامية في العراق . باستعمال صفائح كرومتوغرافية الطبقة الرقيقة (TLC) والمذيب BAW بنسبة (4:1:5).

شخصت بعض المركبات استناداً إلى بعض المصادر المتوفرة مثل [16] و [17] بعد مطابقتها مع قيم الجريان النسبي *Rf* والألوان تحت الأشعة فوق البنفسجية والأمونيا ، وأعطيت أرقام للمركبات الموجودة في مستخلص الأوراق وأخرى لتلك الموجودة في مستخلص الرؤوس الزهرية للمركبات التي لم يتم تشخيصها (جدولي 1 و 2).

ومن جانب آخر تم الكشف عن المركبات الكيمائية لونياً باستخدام كواشف مختلفة بالاعتماد على نوع الكشف ومنها 1- كاشف هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي للكشف عن الفلافلونوبيريدات [18].

2- كاشف فولن و كاشف كلوريد الحديديك للكشف عن الفينولات حسب [19] و [20] على التوالي.

3- كاشف داركندروف و كاشف واكنر للكشف عن القلويات [18].

4- كاشف خلات الرصاص للكشف عن الثنائيات [21].

5- كاشف كلوريد الزئبق للكشف عن الصابونينيات [18].

6- كاشف الأيمودين للكشف عن الأيمودين [22].

كما تم تقدير النسبة المئوية للبروتين الخام باستعمال جهاز نقطير التتروجين كليدال Kijeldhal method بعد معرفة النسبة المئوية للتتروجين الكلي [23] .

النتائج Results

أظهرت الدراسة الكيمائية وجود تغيرات واضحة في توزيع المركبات الكيمائية ما بين الأنواع المدروسة سواء من حيث عدد أو أنواع المركبات في كلا المستخلصين الكحوليين للأوراق والرؤوس الزهرية وكما موضح في الأشكال (1 و 2 و 3 و 4 و 5) والجدولين (1 و 2) . بصورة عامة فقد شخص أعلى عدد للمركبات الكيمائية والبالغة (20) مركباً في المستخلص الكحولي للأوراق ، في حين شخص (17) مركباً في مستخلص الرؤوس الزهرية والشكليين (1 و 2) يوضحان طريقة توزيع تلك المركبات على صفائح الكرومتوغرافية بعد إن أعطي رقم لكل مركب في كلا المستخلصين لغرض التمييز بين مركب وآخر في حالة عدم التعرف عليه من قيمة الجريان النسبي *Rf* الخاص به . فقد توزعت المركبات الذائبة في المستخلص الكحولي للأوراق (11) نوعاً ضمن أنواع العائلة الربيعية حيث انفرد النوع *Lysimachia linum-stellatum* باحتواه على أقل عدد من المركبات والبالغة (3) مركبات ، في حين سجل النوعين *Dionysia odora* و *Dionysia bormulleri* أعلى عدد للمركبات والبالغة (9) مركباً، بينما سجلت بقية الأنواع تداخلاً واضحاً متمثلة (4) مركبات في النوع *Samolus valerandi* و (5) مركبات في أنواع جنس *Anagallis* و (6) مركبات للنوعين *Lysimachia dubia* و *Androsace maxima* ، أما النوع *Primula auriculata* فتمثل بـ (7) مركبات والنوع *atropurpurea* (8) مركبات (شكل 3).

وكذلك الحال مع مستخلص الرؤوس الزهرية فقد بلغ الحد الأدنى لعدد المركبات الكيمائية (3) مركبات في أنواع جنس *Anagallis* في حين سجل النوع *P.auriculata* الحد الأعلى وبالبالغة (12) مركباً. أما بقية الأنواع فتغيرت القيم فيما بينها ، فقد تمثل النوعين *Androsace maxima* و *Androsace maxima* *L.linum-stellatum* بوجود(4) مركبات، والنوعين *dubia* و *atropurpurea* . (5) مركبات ، أما نوعي جنس *Dionysia* اظهرا تغيراً فيما بينهما فالنوع *D.bormulleri* وجده في (6) مركبات والنوع *D.odora* كان يمتلك (7) مركبات كيمائية . أما جنس *Samolus* انفرد باحتواه على (9) مركبات (شكل 3).

تبين من الشكل (4) إن المركب (11) تميز بسيادته في مستخلصات الأوراق لـ(9) أنواع على العكس من المركب (1) الذي ظهر في نوع واحد فقط وهو *Androsace maxima* ، أما المركبين (2 و 18) فقد ظهرما في (6) أنواع مقارنة مع المركبات (3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10 و 13 و 15 و 16 و 19) التي ظهرت في نوعين فقط من الأنواع المدروسة ، واقتصر المركبين (17 و 20) على (3) أنواع فقط ، في حين كانت المركبات (5 و 9 و 14) موجودا في (4) أنواع ، وانفرد المركب (12) بوجوده في (7) أنواع فقط.

أما الشكل (5) فإنه يوضح عدد الأنواع التي يتواجد فيها المركبات الكيميائية ضمن مستخلصات الرؤوس الزهرية ، فقد بلغت (10) أنواع في حالة المركب (8) على العكس من المركبين (14 و 15) اللذان وجد فيما نوع واحد فقط وهو *P.auriculata* ، في حين تباينت عدد الأنواع باختلاف المركبات فقد سجل نوعين فقط لكل من المركبات (1 و 2 و 5 و 6 و 16 و 17) ، و (3) أنواع في المركبين (3 و 7) ، و (4) أنواع نباتية في كل من المركبات (4 و 11 و 13)، أما المركب (12) فوجد (5) أنواع ، والمركب (10) في (6) أنواع ، والمركب (9) قائم (8) أنواع مختلفة.

وبالنظر لعدم توفر المركبات القياسية Standards لدى الباحث لهذا لم يتم تشخيص جميع المركبات الكيميائية لكلا المستخلصين باستثناء بعض المركبات وبالاعتماد على قيمة الجريان النسبي Rf ولون المركب بعد تعريضه للأشعة فوق بنفسجية وبخار الأمونيا ومقارنتها مع ما توفر من المصادر وأقيمت المركبات الأخرى غير المشخصة معطياً لها أرقاماً ومسجلاً عليها صفاتها اللونية (جدولين 1 و 2). فقد اشتراك المستخلصات الكحولية للأوراق والرؤوس الزهرية بوجود (5) مركبات كيميائية وهي Daphnetin و Kaempferol و Quercetin 3-glucoside و Quercetin 3-rhamnoside و Rutin و قيمة Rf لها هي 0.81 و 0.72 و 0.58 و 0.44 على التوالي كما تراوحتألوانها بين الأصفر – البنى والأصفر الشاحب والأصفر الداكن . أما بقية المركبات المشخصة في مستخلص الأوراق فهي Luteolin 7- glucoside ذو لون بنفسجي باهت- سماوي وقيمة Rf مساوية إلى 0.53 والمركبين 5-glucoside و Patuletin 3-glucoside و Isorhamnetin 5-glucoside بقيمة Rf مساوية إلى 0.40 ولون أصفر داكن و 0.27 ولون أصفر شاحب على التوالي (جدول 1). وفيما يخص المركبات المشخصة في مستخلص الرؤوس الزهرية فتمثلت بالمركب Apigenin بقيمة Rf تقدر 0.98 ولون أصفر- برتقالي وكذلك مركب Chlorogenic acid بقيمة Rf 0.63 ولون أصفر-بني ، في حين كانت قيمة Rf مساوية إلى 0.32 ولون أزرق شاحب – أخضر مميزة للمركب Quercetin 3-rutinoside (جدول 2).

أجري عدد من الكشوفات الكيميائية على المستخلص الكحولي للأوراق لغرض التأكيد من وجود المركبات الفينولية والفالفونيدية فظهرت إن جميع الأنواع قيد الدراسة حاوية عليها بإعطائها النتيجة الموجبة باستثناء النوع *S.valerandi* الذي اظهر اختبارا ضعيفاً مع كاشف هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي للفلافونيدات وكاشف كلوريد الحديديك للفينولات.

في حين أعطى الكشف عن المركبات القلويية تبايناً واضحاً بين الأنواع فالبعض أعطى نتيجة موجبة إكلا الكاشفين (داركندروف وواكتر) كما في الأنواع *L.dubia* و *L.atropurpurea* و *S.valerandi* و *D.odora* و *P.auriculata* و *Androsace maxima* و *Anagallis arvensis* var. *caerulea* و *Anagallis arvensis* var. *arvensis* بالاختبار الإيجابي مع الكاشف واكتر ولكنه كان ضعيفاً في كاشف داركندروف . أما النوع *D.bormulleri* فقد أعطى الاختيار الإيجابي مع واكتر وسلبي مع داركندروف على العكس من النوع *L.linum-stellatum* الذي كان له نتيجة موجبة مع داركندروف وسلبية مع واكتر (جدول 3).

أعطى الكشف عن المركبات التаниنية والصابونية نتيجة موجبة ولجميع الأنواع قيد الدراسة باستثناء الاختبار الضعيف للنوع *Androsace maxima* ونوعي جنس *Dionysia* للمركبات التаниنية والصابونية، على التوالي. في حين كانت نتيجة الكشف عن الایمودين ايجابية ولجميع الأنواع باستثناء نوعي جنس *P.auriculata* والنوع *L.linum-stellatum* *Dionysia* والنوع *D.bormulleri* (جدول 3).

سجلت النسبة المئوية للبروتين الخام الكلي تغيراً واضحاً متمثلة بالحد الأدنى البالغة 7.475 % في النوع *P.auriculata* والحد الأعلى البالغة 13.938 % في النوع *L.atropurpurea* ، في حين تميزت بقية الأنواع بتقارب النسب مع بعضها كما في النوعين *Anagallis arvensis* var. *caerulea* و *Anagallis arvensis* var. *arvensis* على التوالي ، وبذا الحال مماثلاً النوعين *L.dubia* و *S.valerandi* وبنسبة 13.381 و 13.588 % على التوالي أيضا. وقللت النسبة المئوية للبروتين نسبياً لتصل 10.556 % للنوعين *Androsace maxima* و *Anagallis foemina* و *D.odora* وتستمر النسبة بالانخفاض لتصل إلى مقدار 8.444 % في النوع *L.linum-stellatum* و 8.231 % في النوع *D.bormulleri* فقد قدرت النسبة المئوية للبروتين الخام فيه بمقدار 7.769 % (جدول 4 شكل 6).

المناقشة Discussion

حضرت التغيرات الكيميائية شأنها شأن بقية الصفات التصنيفية إلى موضوع التقييم من قبل التكنولوجيا بعد الإثبات بأن التصنيف الكيميائي Chemotaxonomy يساهم بشكل كبير مع العمل التصنيفي في الماضي وتوواصل عمله بالتأكيد في المستقبل [24]. ومما لا شك فيه أن جميع النباتات قد تحتوي على مركبات كيميائية متماثلة إلا أنه ليس من الضروري إن تكون على درجة واحدة من القرابة، لذا أصبح من الممكن الاعتماد على التصنيف الكيميائي في حل المشكلات التصنيفية وعلى مستوى من المراتب التصنيفية ، فعلى سبيل المثال تمتلك العائلتان البقولية Leguminaceae والبازنجانية Solanaceae المركبات القلويدية إلا إنها تعتبر عائلتين مختلفتين عن بعضهما البعض، وكذلك الحال مع العائلتين الرمادية Chenopodiaceae والحنطة السوداء Polygonaceae Juss.

والدراسة الحالية على الرغم من قلة الإمكانيات لعدم وجود المواد القياسية Standard إلا إنها استطاعت توضيح العلاقة بين الأنواع والأجنس ضمن العائلة الربيعية من ناحية قربها أو بعدها عن بعضها البعض. فمن المستخلص الكحولي للأوراق لوحظ اشتراك جميع الأنواع المدرسوة باستثناء النوعين *L.linum-stellatum* و *S.valerandi* الذي شخص على أنه Quercetin 3-glucoside بالاعتماد على لونه الأصفر- البني وقيمة الجريان النسبي المقاربة إلى 0.58، كما اشتراك مستخلصات الرؤوس الزهيرية لجميع الأنواع باستثناء النوع *L.atropurpurea* في المركب (8) بلونه الأصفر- البني وقيمة الجريان النسبي المقاربة إلى 0.72 والشخص على أنه Quercetin 3-rhamnoside وكذلك المركب (9) الذي عرف بأنه موجود بكافة الأنواع ماعدا نوع جنس *Lysimachia* (Chlorogenic acid (Aglycones) الموجود في النوع *P.auriculata* وهو ذو اللون الأصفر- البني وقيمة الجريان النسبي المقاربة إلى 0.63 وإن دل هذا الاشتراك على شيء فإنه يدل على قوة الترابط بين أجناس العائلة المدرسوة (جدول 1 و 2 وشكل 4 و 5).

كما تبيّن اشتراك عدد من المركبات في مستخلصي الأوراق والرؤوس الزهيرية منها Kaempferol و Daphnetin و Quercetin 3-glycoside و Quercetin 3-rhamnoside Rutin بـألوانها الأصفر – البني والأصفر الشاحب والأصفر الداكن وقيمة Rf لها هي 0.83 و 0.81 و 0.72 و 0.72 و 0.58 و 0.44 ، على التوالي وربما يعزى هذا الاشتراك في المواد كون إن الرأس الزهيري عبارة عن أوراق محورة. لذا جاءت نتائج الدراسة متوفقة مع ما أكد [15] عن وجود المركبين و Kaempferol Quercetin في بعض أنواع الجنسين *Lysimachia Primula* و كذلك ما ذكره [26] عن وجود Quercetin في الجنسين *Dionysia Primula* على الرغم من أن [27] أشار إلى إن معدل Quercetin و Kaempferol الموجودين في الأوراق وبتلات أزهار جنس *Primula* مرتبطة مع معدل السكريات ، وتوزيع هذه الكلايوكسيدات له علاقة مع تصنيف مستويات الأجنس الثانوية لهذا المركب الشائع Kaempferol 3-gentiotrioside يكون نادراً في قطاع *Candelabra* وغير موجود في قطاع (كلا الجنسين الثنائيين لـ *Aleurita*) ليعرض عنه بمادة Rutin الذي يكون نادراً في الجنس الثنائي Sikkimenses . *Craibia Auganthus* وفقدوا في الجنس الثنائي .

ومن ملاحظة الشكل (3) يتبيّن التشابه الكبير في أعداد المركبات الفلافونويدية والفينولية لمستخلصي الأوراق والرؤوس الزهيرية بين أنواع الجنس الواحد كما في أنواع الجنس *Anagallis* ونوعي جنس *Dionysia* في حين كان هنالك تبايناً واضحاً لأنواع جنس *Lysimachia* حيث ظهر تقارب كبير بين النوعين *L.linum-stellatum* و *L.dubia* و *L.atropurpurea* وتباعد النوع *Lysimachia* عنهما مما يؤكّد سبب فصل هذا النوع من جنس *Lysimachia* إلى جنس آخر يدعى *Asterolinon Hoffmanns. and Link* [28] ، على الرغم من إبقاءه تحت جنس *Lysimachia* من قبل [29] . ومن جانب آخر أمكن عزل النوع *maxima* عن بقية الأنواع المدرسوة بـأفاده بالمركب الأول ضمن مستخلص الأوراق في حين عزل النوع *P.auriculata* بأحتوائه المركبين (14 و 15) في مستخلصات الأوراق تفوق أعدادها في مستخلصات الرؤوس الزهيرية دون غيره من الأنواع . ومن ملاحظة الشكل نفسه يُلاحظ إن أعداد المركبات في مستخلصات الأوراق تفوق أعدادها في مستخلصات الرؤوس الزهيرية باستثناء الأنواع *L.linum-stellatum* و *S.valerandi* و *P.auriculata* و ربما يكون سبب اختلاف الصبغات الموجودة في الرؤوس الزهيرية ، فقد أشار [1] إن العائلة الربيعية تمتاز بوجود أنواع مختلفة من صبغات Anthocyanine وبالتالي إلى زيادة في أنواع المركبات الكيميائية . كما إن تفوق أنواع جنس *Dionysia* والنوع *P.auriculata* بأعداد المركبات الكيميائية لمستخلص الأوراق وباللغة (9) مركبات قد يعزى إلى وجود مادة Farina منتشرة بشكل مسحوق أصفر على سطح الأوراق والأجزاء الزهيرية [27 و 30 و 1] . فضلاً عن أن وجود علاقة بين إنتاج الفلافونون في مادة Farina والتخليق الوراثي لجنس *Primula* كان له أهمية تصنيفية لوجوده بشكل واسع في الأجناس *Primuleae* و *Dodecatheon* و *Cortusa* و *Dionysia* ضمن عائلة [27] ، في حين أشار [31] بأن مادة Farina هي ليست مسحوق طحيبي بل تحتوي بشكل رئيسي على Flavone .

إن وجود المركبات الفينولية والفلافونيدية في جسم النبات خاصة خلايا الأوراق تلعب دوراً كبيراً في حماية النبات من أضرار الأشعة فوق البنفسجية خاصة إذا كانت البشرة غنية بالشعيرات سواءً الغدية منها أو غير الغدية [32] ، لذا قد يكون هو سبب آخر لزيادة عدد المركبات الكيميائية في مستخلص الأوراق الغني جداً بالشعيرات الغذية التي امتازت بها نوعي جنس *Dionysia* والنوع *P.auriculata* حيث تقوم تلك الشعيرات بـأفزاذ مواد كيميائية يمكن استعمالها كأدلة وراثية [33] ، في حين إن [31] أشاراً إلى إن المواد المفرزة من الشعيرات الغذية هي بالحقيقة عبارة عن Flavonoids و Aglycones .

كما أشار [34] بأن استعمال صفات الشكل المظاهري للأزهار في دراسة التطور لنباتات مغطاة البذور لها أساس تطوري وراثي معقد مقارنة مع العوامل الوراثية المسيطرة على وجود مركبات فلافونويدية مختلفة . وبيّنت الدراسات الإنزيمية والوراثية بأن مركب واحد قد يخلق بمسارات مختلفة وهذا له مضمون هام لتوزيع الفلافونويدات في معنى التطور. لذا فإن أهمية الدراسات الإنزيمية والوراثية للمركبات الفلافونويدية في معنى التطور تكون من خلال الاستفادة التصنيفية على مستوى جنس أو أقل أو حتى على مستوى عائلات نباتية من مغطاة البذور.

ومن جانب آخر من الدراسة أجريت سلسلة من الكشوفات لإثبات وجود المركبات الكيميائية باستخدام كاشف هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي للفالفنوبودات وكاشف فولن وكلوريد الحديديك للمركبات الفينولية وكاشف خلات الرصاص وكاشف كلوريد الزئبقيك للمركبات الثانية والصابونية، على التوالي معطياً نتائجاً ايجابياً لجميع الأنواع المدرسوة باستثناء بعض الاختبارات الضعيفة لبعض الكاشف (جدول 3) لأسباب قد تعزى إلى نوعية الأوراق المستعملة للاستخلاص كونها ناضجة أو غير ناضجة [35] أو قد يعزى إلى البيئة التي أخذت منها العينات فقد أشار [36] إن اغلب المركبات الكيميائية قد لا تظهر أثناء الكشف أو قد تظهر بكميات قليلة لا تكاد تكون واضحة بسبب اختلاف ظروف التربة وعوامل الجو الفصلية والمناخية لذا يفضل عادة أن تفحص العينات للنوع نفسه تحت ظروف مختلفة لضمان الكشف عن تلك المركبات.

كما اجري كشف آخر عن القلويديات باستخدام كاشفي داركتدرف وواكنر ، فأصبح من الممكن عزل الأنواع *Androsace* و *P.auriculata maxima* لعدم وجود القلويديات وبالاتجاه المعاكس عزلت الأنواع *L.atropurpurea* و *S.valerandi* و *L.dubia* لوجود تلك القلويديات، أما بقية الأنواع المدروسة فأظهرت تداخلاً بين النتائج الإيجابية والسلبية حسب نوع الكاشف. وبسيط مماثل أمكن عزل نوعي جنس *Dionysia* والنوع *L.linum-stellatum* والنوع *P.auriculata* عن بقية الأنواع المدروسة من خلال النتيجة السلبية لفحص الأيموبين.


اختلافت النسب المئوية للبروتين الخام بين الأنواع المدروسة وهذا ما يظهره جدول (4) وشكل (6) إذ إن أعلى نسبة بروتين ظهرت في النوع *L.atropurpurea* البالغة 13.938% وأنهى نسبة للبروتين ظهرت في النوع *P.auriculata* البالغة 7.475% في حين تقارب النسب وتداخلت مع بعضها في بقية الأنواع. فقد أكد [37] إن دراسة كمية البروتين الكلية لها أهمية في معرفة كمية القلويديات والتي بدورها لها أهمية في المعالجة الكيميائية Chemotherapy.

من هذا يتضح إن التغيرات الكيميائية قيمة تصنيفية كبيرة من خلال دعم النتائج التي تم الحصول عليها من صفات تصنيفية أخرى كالصفات المظهرية، وكذلك من خلال إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تتعلق بالعلاقات التطورية المتعددة على بعض الأدلة المشكوك فيها أو المعترض عليها من قبل مصادر أخرى. بالإضافة إلى إن التصنيف الكيميائي يكشف الوحدات التصنيفية المهجنة، فضلاً عن استعماله في التصنيف العددي بإضافة صفات لوجود أو عدم وجود المركبات الكيميائية لكل وحدة تصنيفية.


المصادر References

- 1- Gibbs, R. D. (1974). Chemotaxonomy of flowering plant . Montreal and London , 3: 1556- 1559.
- 2- Kitagawa, I. ; Matsuda, A. and Nishimura, T. (1967). Comparative study on the sapagen in constituents of five Primulaceous plants. Chem. Pharm . Bull., 15: 1435- 1437.
- 3- Zwaving, J. H. (1971) . The Saponins of Primrose and Soapwort , well known expectorants. Pharm. Weekblad, 106: 629 – 648.
- 4- Hausen, B.M. (1978). On the Occurrence of Contact Allergen Primin and other Quinoid compound in species of family of Primulaceae. Arch. Dermat. Research, 261 (3): 311-321 .
- 5- Harbone , J.B. (1982). Introduction to Ecological Biochemistry . 2nd. ed. Academic Press . London . New York. Pp:278.
- 6- Helmke, R.(1938). The Prevention of Primrose Dermatitis by use of Ammonia .Dermat . Wchnschr. 106: 669.
- 7- Kotb , F.H. (1985). Medicinal plant in Libya . Arab Encyclopedia House, Beirut. Lebanon.
- 8- Chevallier, A. (1996). The Encyclopedia of Medical plants. A. Dorling. Kindersely Book , London.
- 9- Shtayeh, M.S.A. and Abu Ghdeib, S.I (1999). Antifungal activity of plant extracts against dermatophytes. Mycosis, 42: 665 – 672.
- 10- Tian, J. K. ; Zou, Z.M. ; Xu, L.Z. and Yang, S.L. (2002). Studies on Chemical Constituents in Herba of *Lysimachia davurica*. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi,, 27(4): 283-284.
- 11- Podolak, I. ; Galanty, A. and Janeczko, Z. (2005). Cytotoxic activity of embelin from *Lysimachia punctata*. Fitoterapia, 76 (3-4):333-335.
- 12- Jiang, Y. ; Li, P. ; Li, S.P. Wang, Y. T. and Tu, P. F. (2007). Optimization of pressurized liquid extraction of Five major flavonoids from *Lysimachia clethroides*. Journal of Pharmaceutical and Biomedical analysis, 43: 341-345.
- 13- Tian, L. J. ; Yang, N. Y. and Chen, W. Q. (2008). Triterpene Saponins from *Lysimachia christinae* . Journal of Asian Natural Products Research, 10 (3): 265-270.
- 14- Calderón-Montaño J.M. ; Burgos-Morón E. ; Pérez-Guerrero C. and López-Lázaro M. (2011). A Review on the Dietary Flavonoid Kaempferol. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 11: 298-344.
- 15- Harborne, J.B. (1973) . Phytochemical Methods : A Guide to Modern Technique of Plant Analysis . London New York, Chapman and Hall. 278 pp.
- 16- Harborne, J.B. (1984) . Phytochemical Methods : A Guide to Modern Technique of Plant Analysis . 2nd. ed. Chapman and Hall .London, UK.
- 17- Al-Zubaidy, A.M. (1998). Systematic study of the genera *Marrubium* L. Ajugal, *Lallemandia* Fisch and C.A. Mey and *Lamium* L. (Labiatae) in Iraq. Ph.D. Thesis, Univ. of Baghdad .
- 18- AL-Khazraji , S.M. (1991). Biopharmacological study of *Artemisia herb-alba* . M.Sc. Thesis . Pharmacy College-Baghdad University .


- 19- **AL-Thahab, A. A. L. (1998).** Activity anti of extract plant local in pathological bacteria. M. Sc. Thesis. University of Babylon.
- 20- **Adedayo, O., Anderson, W. A., Moo – Young, M., Snicickus, P. A. and Kolawale, D.O. (2001).** Phytochemistry and activity antibacterial of *Senna alata* flower. Pharmaceutical Biology, 39: 1-5.
- 21- **Ahmad, I.; Mehmood, Z. and Mohammad, F. (1998).** Screening of some Indians medicinal plants for their antimicrobial properties. J. Ethanopharmacol. 62: 183-193.
- 22- **Peterson, F.J. (1905).** Material Medica and Clinical Therapeutics Rheum officinale. P: 1100-1113.
- 23- **Egan, H. , Kirk, R. and Sewyer, R. (1988).** Person's Chemical Analysis of Foods (8th. ed.) Longman Scientific and Technical. 591pp.
- 24- **Mannheimer, C.A. (1999).** An Overview of chemotaxonomy , and its role in creating a phylogenetic classification system. National Botanical Research Institute, Ministry of Agriculture, water and Rural Development , Windhoek :87-90.
- 25- **AL-Rubaie, E.M.A. (2008).** A Systematic study of the family Polygonaceae Juss. In Iraq. Ph.D. Thesis, University of Basrah.
- 26- **Swain, T. (1963).** Chemical Plant Taxonomy. Academic Press , London and New York. p:543.
- 27- **Harborne, J.B. (1968).** Comparative Biochemistry of the Flavonoids –VII Correlation, between Flavonoid Pigmentation and Systematics in the family Primulaceae. Phytochemistry, 7(8):1215-1230.
- 28- **Tutin, T.G. ; Heywood, V.H. ; Burges, N.A. ; Valentine, D.H. ; Walters, S.M. and Webb, D.A. (1972).** Flora Europaea. Cambridge, University Press.,3: 14-29.
- 29- **Davis, P. H. (1978).** Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6, Edinburgh ,University of Press. P: 111 – 142.
- 30- **Wendelbo, P. (1961).** Studies in Primulaceae 1. A Monograph of the genus *Dionysia* Fenzl. Arbok Univ. Mat-Naturv. Ser.3:1-83.
- 31- **Valant - Vetschera , K.M. and Brem, B. (2006)** Chemodiversity of Exudate Flavonoids , as Highlighted by selected publications of Eckhard Wollenweber Natural Product Communications,1(11) :921-926.
- 32- **Karaborniotis, G. and Fasseas, C. (1996).** The Dense Indumentums with its Polyphenol Content may replace the protective role of the epidermis in some Young Xeromorphic leaves. Can. J. Bot., 74: 347-351.
- 33- **Fico, G ; Rodondi, G. ; Flamini, G. ; Passarella, D. and Tom, F. (2007).** Comparative phytochemical and morphological analyses of three Italian *Primula* species . Phytochemistry ,68 (12): 1683-1691 .
- 34- **Crawford, D.J.(1978).** Flavonoid Chemistry and Angiosperm Evolution. The Botanical Review , 44 (4) : 431 – 456 .
- 35- **Tatum, J.H ; Berry, R.E. and Hearn, C. J. (1974).** Characterization of Citrus cultivars and Separation of Nucellar and zygotic seedlings by Thin Layer Chromatoghy. Florida State Horticultural Society, P: 75-81.
- 36- **Erdtman, H., 1963.** Some Aspects of Chemotaxonomy. In: Swain, T. (Ed.), Chemical Plant Taxonomy, Academic Press, London, pp. 89-125.
- 37- **Ünal, M. ; Yentür, S. ; Cevahir, G. ; Sarsağ, M. and Kösesakal, T. (2003).** Physiological and Anatomical investigation of flower colors of *Primula vulgaris* L. Biotechnol. and Bioterchnol. Eq. 17(2): 102-108 .




شكل (1) موقع المركبات الفلافونويدية على صفيحة TLC في مستخلص الأوراق لأنواع وأجناس العائلة الربيعية




شكل (2) موقع المركبات الفلافونويدية على صفيحة TLC في مستخلص الرؤوس الزهرية لأنواع وأجناس العائلة الربيعية



شكل (3) عدد المركبات الفلافونويدية في مستخلص الأوراق والرؤوس الزهرية لكل نوع من أنواع وأجناس العائلة الريبيعة



شكل (4) عدد الأنواع التي يتواجد فيها كل مركب فلافلونيدي وفيتولي في مستخلص الأوراق.



شكل (٥) عدد الأنواع التي يتواجد فيها كل مركب فلافلونيد وفينولي في مستخلص الرؤوس الزهرية

جدول (١) خصائص المركبات الفلافونيدية والفينولية في مستخلص الأوراق لأنواع العائلة المدرسة.

رقم المركب	قيمة الجريان النسبي Rf في محلول BAW	لون المركب تحت الأشعة فوق البنفسجية	تشخيص المركب حسب المصادر
1	0.97	اصفر داكن	
2	0.93	اصفر فاتح- برتقالي	
3	0.90	سمائي فاتح جدا- تركوازي	
4	0.83	اصفر - بني	kaempferol
5	0.81	اصفر شاحب	Daphnetin
6	0.75	بنفسجي باهت- سمائي فاتح	
7	0.72	اصفر - بني	Quercetin 3-rhamnoside
8	0.68	بنفسجي فاتح- ازرق	
9	0.66	اصفر - بني	
10	0.62	بنفسجي باهت- ازرق	
11	0.58	اصفر - بني	Quercetin 3-glucoside
12	0.54	اصفر - بني	
13	0.53	بنفسجي باهت- سمائي	Luteolin 7- glucoside
14	0.48	اصفر - بني	
15	0.45	بنفسجي باهت- سمائي	
16	0.44	اصفر داكن	Rutin
17	0.40	اصفر داكن	Patuletin 3-glucoside
18	0.39	سمائي فاتح جدا- تركوازي فاتح	
19	0.33	بنفسجي باهت- سمائي	
20	0.27	اصفر شاحب	Isorhamnetin 5- glucoside

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

جدول (2) خصائص المركبات الفلافونيدية والفينولية في مستخلص الرؤوس الزهرية لأنواع العائلة المدروسة.

رقم المركب	قيمة Rf في الجريان BAW محلول	لون المركب تحت الأشعة فوق البنفسجية	تشخيص المركب حسب المصادر
1	0.98	اصفر - برتقالي	Kayaflavone(apigenin)
2	0.95	اصفر - بني	
3	0.90	سمائي فاتح جدا- تركوازي	
4	0.83	اصفر - بني	kaempferol
5	0.81	اصفر شاحب	Daphnetin
6	0.78	اصفر شاحب- بني	Luteolin
7	0.75	بنفسجي باهت- سمائي فاتح	
8	0.72	اصفر - بني	Quercetin 3- rhamnoside
9	0.63	اصفر - بني	Chlorogenic acid (Aglycones)
10	0.58	اصفر - بني	Quercetin 3-glucoside
11	0.54	اصفر - بني	
12	0.50	سمائي فاتح جدا- تركوازي فاتح	
13	0.44	اصفر داكن	Rutin
14	0.41	اصفر - برتقالي	
15	0.38	اصفر شاحب	
16	0.32	ازرق شاحب - اخضر	Quercetin 3- rutinoside
17	0.30	اصفر شاحب- بني	

جدول (3) الكشف عن المركبات الكيميائية في المستخلصات الكحولية لأنواع وأجناس العائلة الربيعية

الأنواع	الفلوبيات	الفينولات		الفالفنيدات		الصالبونيات		الاكتيفات الإيمودين	الاكتيفات الإيمودين
		كافش كلوريد الزنبقيك	كافش خلات الرصاص	كافش كلوريد الحديديك	كافش فولن	كافش هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي	كافش واكتنر		
<i>Anagallis arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	*✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Anagallis arvensis</i> var. <i>caerulea</i>	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Anagallis foemina</i>	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Androsace maxima</i>	*	✓	*✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<i>Dionysia bormulleri</i>	*	✗	*✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
<i>Dionysia odora</i>	*	✗	*✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
<i>Lysimachia atropurpurea</i>	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Lysimachia dubia</i>	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Lysimachia linum-</i>	*	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓


									<i>stellatum</i>	
x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	<i>Primula auriculata</i>	10
✓	✓	✓	✓	*✓	✓	*✓	✓	✓	<i>Samolus valerandi</i>	11

(✓ اختبار ضعيف)

جدول (4) محتوى التتروجين الكلي والبروتين الخام في الأنواع المدرستة للعائلة الربيعية.

نوع	الأنواع	التركيز (ml HCl المستهلك)	النتروجين الكلي (%)	البروتين الكلي (%)
<i>Anagallis arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	1	3.059	2.141	13.381
<i>Anagallis arvensis</i> var. <i>caerulea</i>	2	3.076	2.153	13.456
<i>Anagallis foemina</i>	3	2.510	1.757	10.981
<i>Androsace maxima</i>	4	2.413	1.689	10.556
<i>Dionysia bornmulleri</i>	5	1.776	1.243	7.769
<i>Dionysia odora</i>	6	1.881	1.317	8.231
<i>Lysimachia atropurpurea</i>	7	3.186	2.230	13.938
<i>Lysimachia dubia</i>	8	3.121	2.185	13.656
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	9	1.931	1.351	8.444
<i>Primula auriculata</i>	10	1.709	1.196	7.475
<i>Samolus valerandi</i>	11	3.106	2.174	13.588

ملاحظة : نسبة التخفيف X 10



شكل (6) النسب المئوية لمحتوى البروتين الكلي في الأنواع المدرستة.