



جمهورية العراق  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة بابل  
كلية التربية للعلوم الصرفة  
قسم الفيزياء

# تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسي على صحة الانسان

بحث مقدم مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة كجزء من  
متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في قسم الفيزياء  
بأشراف

م.م. آلاء نجاح هادي

اعداد الطالبة

نوره ناصر صالح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ

سُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ وَهَمَّ لَا يُشْعُرُونَ ﴾

صدق الله العلي العظيم

سورة النمل: الآية - ١٨

## الأهداء

إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛

فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم العالي

والذي الحبيب.

إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش،

وراعتني حتى صرت كبيرة

أمي الغالية.

إلى أخواتي العزيزات اللواتي ساندني ولم يتركني وحدي

إلى كل من علمني حرفاً..... من القلب شكراً لكم جميعاً

## الشكر والتقدير

أول مشكور هو الله عز وجل، ثم والداي علي كل مجهوداتهم منذ ولادتي إلى هذه اللحظات، أتم كل شيء أحبكم في الله أشد الحب.

يسرني أن أوجه شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو ساهم معي في إعداد هذا البحث بإصالي للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من مراحلها، وأشكر علي وجه الخصوص استاذتي الفاضلة م.م. آلاء نجاح هادي علي مساندي وإرشادي بالنصح والتصحيح وعلى اختيار العنوان والموضوع، كما أن شكري موجه إلى قسم الفيزياء في جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الصرفة على رعايتهم تقسماً ودعمهم للمجهودات المبذولة من قبل أساتذتنا الكرام في الجامعة لتوفير أفضل بيئة للتدريس في أفضل الأحوال التي تلائم طلبة العلم.

## قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
I	الآية القرآنية
II	الأهداء
III	الشكر والتقدير
IV	قائمة المحتويات
V	
١	الفصل الاول
٢	١-١ المقدمة:-
٢	١-٢ الإشعاع :
٤	١-٣- مصادر الاشعاع الكهرومغناطيسي
٧	١-٤ انواع الاشعاع
١٨	١-٥- الكشف عن الاشعاع
٢٢	الفصل الثاني تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسي على صحة الانسان
٢٣	١-٢ مقدمة
٢٤	٢-٢ تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي في مجال الطب
٢٦	٢-٣ تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي في دراسة وتشخيص أمراض الجهاز الهضمي
٢٨	٢-٤ التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين
٣٠	٢-٥- السرطان
٣١	٢-٦- انخفاض متوسط العمر
٣٥	الفصل الثالث التلوث الاشعاعي
٣٦	١-٣ مقدمة
٣٧	٢-٣ التأثيرات البيولوجية للإشعاع الغير مؤين
٣٧	٣-٣ مصادر التلوث الاشعاعي
٤٠	٣-٤ طرق الوقاية من الاشعاع المؤين
٤٢	٣-٥ طرق الوقاية من الاشعاع الغير مؤين
٤٣	الخاتمة
٤٤	المصادر

## الخلاصة :

لقد تناولنا في هذا البحث ثلاث فصول، الفصل الأول يتحدث عن الإشعاع الكهرومغناطيسي، وتطرقنا في هذا الفصل إلى أهم المواضيع الخاصة بالإشعاع ومصادره وأنواعه وكيفية الكشف عن الإشعاع. أما الفصل الثاني تحدثنا عن تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي على صحة الإنسان حيث يلعب الإشعاع الكهرومغناطيسي دوراً أساسياً في الطب الحديث يستخدم في التشخيص والعلاج ومتابعة تطور الأمراض. أما الفصل الثالث يتحدث عن التلوث الإشعاعي ومصادره وطرق الوقاية منه سواءً كان الإشعاع مؤين أم غير مؤين.

الفصل الاول

الاشعاع الكهرومغناطيسي

**Electromagnetic Radiation**

## ١-١ المقدمة:-

يعدّ الإشعاع الكهرومغناطيسي من الظواهر الفيزيائية الأساسية التي تلعب دوراً مهماً في تفسير العديد من الظواهر الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. ويقصد بالإشعاع الكهرومغناطيسي انتقال الطاقة عبر الفضاء أو الوسط المادي على شكل موجات ناتجة عن تذبذب المجالين الكهربائي والمغناطيسي المتعامدين مع بعضهما البعض، وينتشران في اتجاه عمودي على كليهما. وتتميز هذه الموجات بقدرتها على الانتقال في الفراغ بسرعة ثابتة تبلغ حوالي  $3 \times 10^8$  متر في الثانية، وهي سرعة الضوء. [١]

ويتكوّن الطيف الكهرومغناطيسي من مجموعة واسعة من الموجات التي تختلف في أطوالها الموجية وتردداتها، وتشمل موجات الراديو، والأشعة تحت الحمراء، والضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية، والأشعة السينية، وأشعة غاما. ولكل نوع من هذه الموجات خصائص واستخدامات مختلفة في مجالات عديدة مثل الاتصالات، والطب، والصناعة، والبحث العلمي. [٢]

وقد ساهمت الدراسات العلمية في توضيح طبيعة الإشعاع الكهرومغناطيسي وخصائصه، خاصة بعد أن وضع العالم الفيزيائي James Clerk Maxwell الأسس النظرية للموجات الكهرومغناطيسية من خلال معادلاته الشهيرة التي بينت العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية. كما أكد العالم Heinrich Hertz وجود هذه الموجات عملياً من خلال تجاربه التي أثبتت إمكانية توليدها وانتشارها. [٣]

وتكمن أهمية الإشعاع الكهرومغناطيسي في تطبيقاته الواسعة في الحياة اليومية، حيث يدخل في تقنيات الاتصالات اللاسلكية، والبث الإذاعي والتلفزيوني، والتصوير الطبي، وأنظمة الرادار، إضافة إلى دوره في نقل الطاقة والإشعاع الشمسي الذي يعد مصدرًا أساسيًا للحياة على سطح الأرض. [٤]


وبناءً على ذلك، يُعدّ فهم الإشعاع الكهرومغناطيسي وخصائصه من الموضوعات المهمة في الفيزياء الحديثة، لما له من تأثير كبير في تطوير العلوم والتكنولوجيا وتفسير العديد من الظواهر الطبيعية. [٥]

## ١-٢ الإشعاع :

هو طاقة تطلق على شكل جسيمات صغيرة من مادة ما، وله أشكال عديدة مثل أشعة الشمس وأشعة الضوء والأشعة السينية وأشعة غاما والإشعاع الصادر من المفاعلات النووية والضوء بحد ذاته إشعاع يطلقه الإلكترون المرتبط في ذرة. يتعرض الانسان للإشعاع يومياً. وفي الحقيقة لطالما كان الإشعاع جزءاً من الحياة اليومية على كوكب الأرض . وينبعث الإشعاع من مصادر طبيعية وصناعية فرق بين الإشعاع على أساس مكوناته وفعاليته تتكون الموجات الكهرومغناطيسية من فوتونات. وينتمي إليها الأشعة السينية

ولأشعة فوق البنفسجية ولأشعة تحت الحمراء . ولأشعة ذات الطول الموجي القصير تسمى موجات ومنها موجات الراديو او موجات الرادار وموجات الميكروويف وهناك نوع اخر من الاشعاع ويسمى إشعاع الجسيمات ويوجد منها العديد مثل جسيمات الفا وجسيمات بيتا وجسيمات بيتا منها الإلكترون ومنها البوزترون - كما تسمى بعضها أشعة وهذه تكون ذرات فقدت واحد او اكثر من الكتروناتها ، كما توجد اشعة نيوترونات وهناك الاشعاع القادم من أعماق الكون مثل الأشعة الارضية وأشعة الكونية وإشعاع الخلفية الميكروني الكوني وإشعاع هوكينغ كما نعرف الإشعاعات الصادرة من النشاط الإشعاعي لبعض المواد كما تتميز بعض المناطق الجيولوجية بإصدارها للإشعاع وهذه تسمى إشعاعات أرضية، وهي ناشئة عن وجود بعض المواد المشعة في صخور تلك الأراضي. ويبين الفحص أن الإشعاعات الصادرة من النشاط الإشعاعي لبعض المواد ماهي الإشعاع جسيمات مثل جسيمات الفا وجسيمات بيتا زمنها ما هو من نوع الموجات الكهرومغناطيسية مثل أشعة كاما وعندما تكون طاقة الأشعة عالية بحيث تستطيع أن تؤين الوسط الذي تمر من خلاله . أي تستطيع فصل الإلكترونات عن ذراتها او جزيئاتها فهذه تسمى إشعاع مؤين وينتمي الى الإشعاعات المؤينة . جزء من الموجات الكهرومغناطيسية والتي تتميز بطاقتها العالية وقدرتها على تأين المادة ومن ضمن هذه الموجات. أشعة كاتما وجسيمات بيتا وجسيمات الفا ولأشعة السينية والشكل رقم (١) يوضح انواع الإشعاعات تبعا للاختلاف طاقته . [٦] حيث نلاحظ في الشكل

الأشعة التي أعلى من الأشعة فوق البنفسجية تكون إشعاعات تستخدم عادة في الطب. مع ذلك فإننا نحصل على جرعات منخفضة منها بشكل دائم عبر الفضاء، أو من الهواء، أو من الأرض، أو من الصخور. يمكننا أن نشير إلى هذه الأنواع من الأشعة ب الأشعة المؤينة. [٧]



الشكل رقم (١) انواع الاشعاعات [١٠]

### ١-٣- مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي :

كل ما هو موجود على سطح الكرة الأرضية يجب ان يكون له مصدر ينتج منه وكذلك بالنسبة للإشعاع ايضاً فهوا ينتج من مصادر طبيعية ومصادر صناعية.

### ١-٣-١ - المصادر الطبيعية للإشعاع

#### الإشعة الكونية :

المصدر الرئيسي لهذه الإشعة ناتج عن الحوادث النجمية في الفضاء الكوني البعيد ومنها ما يصدر عن الشمس خاصة خلال التوهجات الشمسية التي تحدث مرة او مرتين كل ١١ سنة مولده جرعة اشعاعية كبيرة الى الغلاف الغازي للارض وتتكون هذه الإشعة الكونية من ٨٧% من البروتونات و ١١% من جسيمات الفا ، وحوالي ١% من النوى ذات العدد الذري مابين ٤ و ٢٦ وحوالي ١% من الالكترونات ذات طاقة عالية جدا وهذه ماتمتاز به الإشعة الكونية ، لذلك فإن لها القدرة الكبيرة على الاختراق .

وعند مرور هذه الاشعاعات المؤينة عبر الغلاف الجوي المغلف للارض فانها تتفاعل مع مكوناته فتتغير محتوياته وتضعف كمياتها التي تصل الى الارض بكميات ضئيلة جدا ليس منها ضرر على الانسان أو بيئته ولهذا يعتبر الغلاف الجوي واقياً من هذه الاشعاعات كما انها تتفاعل مع نوى الذرات الغلاف الجوي مولدة بذلك الكترونات سريعة واشعة كاما ونيوترونات وميزونات ولا يستطيع احد تجنب الإشعة الكونية ولكن شدتها على سطح الأرض تتباين من مكان الى اخر حيث تتغير الجرعة الاشعاعية التي يتعرض لها الانسان من هذه المصدر الاشعاع بتغير موقعة على الكرة الارضية . [١٥]

فالإشعة الكونية تقل عند خط الاستواء وتزداد باتجاه القطبين وعند الارتفاعات العالية من سطح البحر فعندما تخترق الإشعة الكونية الغلاف الجوي تتفاعل النيوترونات الكونية مع غاز النيتروجين (N14).

او بهذا ينتشر الكربون C14 المشع المتكون في الغلاف الجوي حتى يصل الى سطح الارض بفعل الامطار فيدخل في تركيب المواد الحية الموجودة في سطح الارض . [٨]

#### -النشاط الطبيعي داخل جسم الانسان :

يشع جسم الانسان من الداخل عن طريق كل من الهواء الذي تتنفسه والغذاء والماء الذي يصل الى جوفه ، فالهواء هو المصدر الرئيسي للجرعة الاشعاعية الطبيعية التي تصل الى داخل جسم الانسان ومصدرها الاساسي غاز الرادون الموجود في جو الارض والمتولد عن طريق التحلل التلقائي لنظير

اليورانيوم U23 والموجود اساسا في قشرة الأرض صخور وكذلك فان الغذاء الذي يتناوله الانسان من النبات يحتوي على مواد مشعة حيث ان المصدر الرئيسي لتلك المواد المشعة في النبات هو التربة التي تمتص منها النباتات تلك المواد مع غيرها من المواد الطبيعية فتدخل في بنائها .

كما ان بعض الغبار الذي يتساقط على النبات يحوي اثارا من تلك المواد المشعة ، وتصل المواد المشعة الى داخل جسم الانسان عن طريق تناوله النباتات او الحوم الحيوانات التي تتغذي على تلك النباتات وتدخل المواد المشعة ايضا مع الماء الذي نشر به حيث يحتوي المياه على اثار قليلة جدا منها .

لذلك تكون اجسامنا مشعة قليلاً من الداخل نظرا الوجود بعض العناصر المشعة فيها مثل البوتاسيوم (K40) والكربون (C14) اضافة الى ذلك فقد يتواج كل من غاز الراديوم (Ra) والثوريوم (Th) المشعين في جسم الانسان الناتجين عن تفكك او اضمحلال الراديوم والثوريوم الموجودين في التربة طبيعياً وذلك عن طريق الجهاز التنفسي. [٩]

### - القشرة الارضية :

معظم المواد المشعة الموجودة على سطح الأرض بشكل طبيعي مصدرها القشرة الارضية ، وتتواجد المصادر الارضية على هيئة منفردة او على شكل مجموعات (سلاسل) .

أما بالنسبة للمواد المشعة المنفردة فمن اهمها عنصر البوتاسيوم (٤٠) حيث يكون حوالي ٠,٠٢% من البوتاسيوم الطبيعي على سطح الأرض ، ويوجد حوالي ١٤٠ من البوتاسيوم المشع في جسم الانسان الذي يزن ٧٠ كغم . وبانسبة للعناصر التي تتواجد ضمن سلاسل ترتبط بعضها مع البعض ضمن خط تحليلي متسلسل حيث يتحلل العنصر الأولي مولد العنصر الثاني وبدوه يتحلل مولد العنصر الثالث ، وهكذا تستمر العملية حيث ينشا عنها سلاسل تؤدي جميعها الى عنصر الرصاص المستقر وهذه السلاسل هي سلسلة الثوريوم وسلسلة اليورانيوم وسلسلة الاكتينيوم وسلسلة النبتونيوم .

في شهر اغسطس من عام ١٩٤٥ فجرت الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم السادس من الشهر القنبلة النووية الأولى في سماء مدينة هيروشيما اليابانية على ارتفاع ٥٨٠م بقوة انفجار بلغت ١٥ طناً تقريباً من الكيماويات المتفجرة، وفي اليوم التاسع من الشهر نفسه فجرت قنبلة ثانية في سماء مدينة ناغازاكي على ارتفاع ٥٠٠ متر شمال مركز المدينة وبلاضافة الى الأثار التخريبية التي نتجت عن الطاقة الانفجارية المتولدة فان الطاقة الحرارية التي نتجت كانت من الكبر بحيث أحرقت كل الاجزاء العارية من جسم الانسان حتى على بعد ٤كم من مركز الانفجار . [١٠]

## ١-٣-٢ المصادر الصناعية للأشعاع :-

١. **المفاعلات النووية :** ان مصادر التلوث الناتج منها هو ما تخرجه من مداخنها بصفة مستمرة من النظائر المشعة نتيجة الانشطار النووي الحادث داخل المفاعلات واهم هذه المواد اليود المشع والغازات المشعة الخاملة مثل غاز الكريبتون (Cr85) ، هذه بلاضافة الى ما يتصاعد من نواتج الانشطار غير الغازي مثل ستر نشيوم (١٩٠) وستر نشيوم (٨٩) ، سيزيوم (S2137). [١٨]
٢. **النظائر المشعة :** لقد ازدادت كميات وانواع النظائر المشعة المنتجة بواسطة المفاعلات النووية والمعجلات النووية ازديادا مضطرا وسريعا وذلك نتيجة لما ثبت من فائدها وفعاليتها في كثير من المجالات الحيوية مثل التشخيص والعلاج الطبي وتطبيقاتها في الصناعة والزراعة والبحوث المختلفة الاكاديمية والتطبيقية ومن اهم هذه النظائر المنتجة ، يود (١١٣١) كوبلت (CO60) سيزيوم (SZ137) ايريديوم (Ir192) فسفور (٣٢) كربون (C14) ، كريبتون (١٤) . [١٧]
٣. **وقود الاقمار الصناعية وأبحاث الفضاء :** تستخدم حاليا النظائر المشعة والمفاعلات الصغيرة كمصدر ثانوي للقوى المحركة للاقمار الصناعية والصواريخ حيث استخدم البلوتونيوم (٢٣٨) الأول مرة في الاقمار الصناعية سنة ١٩٦٢ وفي حالة الحاجة الى مصدر قوي مرتفع تستخدم انواع معينة من المفاعلات الخفيفة الوزن مثل مفاعل اليورانوم المخلوط بهيدريد الزنك والمستخدم فيه معدن الصوديوم للتبريد والزنابق المغلي وتتخلص هذه المفاعلات من مخلفاتها المشعة عن فتحة العادم حيث تعتبر مصدر جديد لتلوث البيئة في طبقات الجو المختلفة وبالطبع تكون نسبة هذه التلوث كبيرة جدا في حالة الحوادث التي قد تحدث للاقمار الصناعية ولتي تسبب تدميرها السريع في الجو . [١١]
٤. **مصانع معالجة الوقود النووي المحترق :** لقد تبين من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية اهمية معالجة الوقود النووي المحترق لاعادة استخدامه او لفصل بعض المواد المشعة ذات الطابع الاستراتيجي منه البلوتونيوم (Pu239) واعادة ما يتصاعد من مداخن هذه المصانع كميات كبيرة من النظائر المشعة مثل اليود (١١٣١) الكريبتون (Cr85) ومشعات بيتا ومشعات الفا هذه الى جانب كميات كبيرة التي يصعب فصلها ولتي يستدعى الأمر اعتبارها مخلفات مشعة صلبة وتدفن في باطن الأرض .
٥. **المخلفات المشعة :** نتيجة لازدياد المضطر الاستخدامات الطاقة الذرية في الاغراض السلمية وخاصة ماله علاقة بتصنيع وتشغيل مفاعلات القوى ومعامل تصنيع ومعالجة الوقود النووي ازدادت كميات المخلفات المشعة الصلبة والسائلة والغازية على اختلاف انواعها هذا بلاضافة الى المخلفات المشعة الناتجة من استخدامات النظائر المشعة في المجالات الأخرى المختلفة مثل الطب

والزراعة والصناعة ولامر الذي ادى ايضا الى زيادة كمية هذه المخلفات ، وبطبيعة الأمر فانه من الضروري التحكم فيها بقدر الامكان التقليل احتمال التلوث البيئي منها ، الا ان هذه التحكم سواء في باطن الأرض أو في قاع البحار او في التخفيف بواسطة الهواء ، ولا يمكن اعتباره حالة امان كاملة تمنع تلوث البيئة فهي تسبب تلوث الثروة السمكية وتلوث المياه الجوفية وخلافه. [ ١٩ ]

٦. **التساقط الذري المحلي من تجارب التفجيرات النووية :-** ان اهم نواتج التساقط المحلي هو ما ينتج من تجارب التفجيرات النووية تحت الأرض أو فوق سطح الارض والبحار والملاحظ ان ٩٠% من نواتج الانشطار يتصاعد من راس السحابة الذرية التي تشبه في شكلها عش الغراب في حين ان ١٠% فقط تبقى في ساق السحابة الذرية وتتساقط محلياً في مكان التفجير هذا الى جانب نواتج التنشيط الاشعاعي بالنيترونات المنبعثة من القنبلة وقت التفجير . [ ٢٠ ]

٧. **التساقط الذري على سطح الكرة الارضية الناتج من تجارب التفجيرات النووية :-** لاشك ان اي تفجيرات نووية تحدث فوق سطح الأرض أو في البحار تتصاعد منها نواتج كثيرة للانشطار النووي الحادث من التفجير وان كمية كبيرة من النظائر المشعة الناتجة من الانشطار تنتشر على مستويات وارتفاعات مختلفة من سطح الارض بل تتعداها الى مناطق بعيدة جدا عن مكونات التفجير وذلك تبعاً الظروف البيئية الحادثة وقت . [ ١٢ ]

#### ١- ٤ انواع الاشعاع:


هنالك نوعان اساسيان للإشعاع هما :

#### ١-٤-١ الإشعاع المؤين Ionizing Radiation :

هو نوع من الإشعاعات ذات طاقة عالية تعمل على تأيين الوسط الذي تمر فيه بسبب اصطدام الشعاع بذرات الوسط مما يؤدي إلى طرد بعض إلكترونات الذرات وتكون الأيونات في الوسط حيث يتميز هذه النوع من الإشعاع بطاقته العالية والتي تجعله يخترق الاجسام المادية الواقعة في مساره وحسب الاختلاف في الطاقة ، والتي تكون على شكل اشعة ومن امثلتها اشعة كاما واشعة بيتا واشعة الفا، ولأشعة السينية . وهناك نوع اخر من الاشعاع ليس على شكل اشعة وانما على شكل حزمة من الموجات الدقيقة والتي تكونها الجسيمات الأولية مثل الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وكل هذه الانواع من الاشعاعات التي ذكرناها تأين الوسط الذي تمر فيه مثل الغازات والسوائل والمواد الصلبة، وأجسام الكائنات الحية. ولهذا فالإشعاعات المؤينة ضارة بالصحة إذا تعدت كميتها حدوداً معينة. وهذا يحتم عدم الإسراف في الكشف الطبي بالأشعة السينية. [ ١ ]

## ١ - اشعة كاما (Gamma rays) $\gamma$

هي أشعة كهْرُ ومِغناطيسية ، تم اكتشافها سنة ١٩٠٠ على يد العالم الفرنسي فيلارد . يرمز لها بـ (  $\gamma$  ) ، وهي أشد طاقة من أشعة إكس ؛ تقدر طاقاتها بين ( ١ ميغا إلكترون فولت) و ( ١٤ ميغا إلكترون فولت) ، بينما طاقة أشعة إكس بين ٥٠ ونحو .. وأشعة كاما هي ناتج للتفاعلات النووية التي غالبا ما تحدث في الفضاء، وفي التفاعلات النووية والمفاعلات النووية ، كما تنتج أيضا من العناصر المشعة مثل اليورانيوم وباقي النظائر المشعة والبلوتونيوم والبولونيوم . ولذلك تحرم المعاهدات الدولية إجراء تفجيرات نووية. وهي تنتشر في الفراغ والهواء، بسرعة مساوية لـ سرعة الضوء ، فهي موجات كهرومغناطيسية وليست جسيمات . لها طاقات عالية وقدرة كبيرة على النفاذ في المواد أكثر من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية وموجاتها قصيرة جداً كما موضح في الشكل رقم (٣) ، وتتراوح أطوال موجتها بين (٠/٠٠) انغستروم إلى (٠/٠٠٥) انغستروم . وأشعة غاما ذات تأثير ضار جداً على الخلايا الحية، ولولا وجود الغلاف الجوي حول الأرض الذي يمتص ويشتمت هذه الأشعة ذات التردد الموجهي العالي والطاقة الكبيرة، لأنعدمت الحياة على سطح الأرض. لأن أشعة غاما لها قدرة فائقة على النفاذ واختراق الأجسام. وترجع قدرتها على تدمير الخلايا الحية أنها أشعة مؤينة، أي أنها تسبب التأين في المادة، وتأين المادة الحية يعني إضرار قد يؤدي إلى موت الخلية. [٤]




الشكل رقم (٢) اشعة كاما [٤]

أما عن استخداماتها، فهي تستخدم في المجالان الطبي والصناعي، ولكن بكميات صغيرة جداً، حيث جرعات الأشعة التي تعطى للمريض محسوبة بدقة كبيرة بحيث تدمر الخلايا السرطانية، وأما خلايا الجسم السليمة فهي تستعيد صحتها بعد فترة نقاهة وتستطيع متابعة سير العمليات الحيوية في الجسم وفي

العلاج الطبي فتستخدم غالباً لقتل الخلايا السرطانية ، وأما في المجال الصناعي فهي تستخدم لتصوير أنابيب البترول لمعرفة جودة الأنابيب وسلامة اللحام ، إضافة إلى قتل الجراثيم في المواد الغذائية المعلبة وتعقيم الحبوب ، وبما أنها نتاج للتفاعلات النووية، فإنها دون شك تستخدم في المفاعل والقنابل النووية.

## ٢- جسيمات بيتا (Beta Particles) $\beta$


هو عبارة عن إلكترون أو بوزيترون ذي سرعة وطاقة عاليتين وينبعث من نوى إشعاعية النشاط مثل البوتاسيوم (٤٠). وجسيمات بيتا المنبعثة هي شكل من الإشعاعات المتأينة وتعرف أيضاً باسم أشعة بيتا. وتسمى عملية إنتاج جسيمات البيتا بتحلل بيتا. ويُرمز لجسيم بيتا بالحرف الإغريقي بيتا (٣) هنالك نوعان من تحلل بيتا إما  $\beta^-$  الذي يصدر إلكترونات ، و  $(+\beta)$  الذي يصدر بوزيترونات . تمتاز جسيمات بيتا بقدرتها الضعيفة على تأيين المواد الموجودة في مسارها ، إلا أن نفاذيتها للمواد ضعيفة نسبياً، بحيث أنها تخترق صفيحة من الألمنيوم بسُمك ٣ ملم كما موضح في الشكل رقم (٣). كما يمكن تسريع الإلكترونات في معجل جسيمات فتزيد سرعتها إلى ما يقرب من سرعة الضوء. جسيمات بيتا هي جسيمات ذات طاقة عالية وسرعة الإلكترون أو البوزترون المنبعث من بعض الأنوية المشعة مثل بوتاسيوم (٤٠) عالية الطاقة ، يصدر عن اضمحلال جسيم بيتا اشعاع نووي تسمى أشعة بيتا ويرمز لها بالحرف الإغريقي (٣) ، والإضمحلال بيتا نوعين (  $\beta^-$  و  $+\beta$  ) ، حيث (  $\beta^-$  ) - تزيد عدد الإلكترونات و (  $+\beta$  ) تزيد البوزيترونات.[٥]



الشكل رقم (٣) جسيمات بيتا [٤]


### ٣- جسيمات ألفا (Alpha Particles)

جسيم ألفا أو أشعة ألفا ، على الرغم من تسميتها أشعة إلا أنها عبارة عن نواة ذرة الهليوم وتتكون من بروتونين ونيوترونين ، تتحد في داخل النواة بقوة نووية كبيرة، بحيث تعتبر أشد نوايا العناصر استقرارا وتماسكا. ذلك لتكونها من ٢ بروتون و ٢ نيوترون وهؤلاء الأربعة يتميزون بأكبر فقد في الكتلة عند اندماجهم لتكوين نواة الهليوم. ولهذا فجسيم ألفا ينتج كثيرا في التفاعلات النووية حيث ليس من السهل تحلله أو تفككه. وهو ذو شحنة كهربائية موجبة مقدارها ٢ وحدة لاحتوائه على ٢ من البروتونات، وقوة ٦ اختراق ضعيفة مع قدرة ضعيفة على النفاذ لثقلها وانخفاض سرعتها كما موضح في الشكل رقم (٣) ، ويمكن إيقافها بقطعة من الورق المقوى. وتمتاز بقدرة كبيرة على تأيين المواد حيث أن معدل التأين في المواد التي تتخللها جسيمات ألفا تتناسب تناسباً طردياً مع مربع شحنة الجسيم تتكون من جسيمات موجبة الشحنة تبلغ شحنتها ضعف شحنة البروتون وبالتالي ضعف شحنة الإلكترون وكتلتها أربعة أمثال كتلة الهيدروجين تقريباً. تتحرك بسرعة كبيرة (١/١٠) سرعة الضوء التي تصل إلى (٣٠٠٠٠٠٠ كم/ثا). ونظراً لثقل هذه الجسيمات وانخفاض سرعتها فإنها لا تنفذ بسهولة خلال الأجسام وعندما تسقط على لوح مغطى بطبقة من كبريتيد الخارصين يحدث وميض يمكن ملاحظته. [٧]




الشكل رقم (٤) جسيمات ألفا [١]

وجسيمات ألفا وهي نواة ذرة الهيليوم ( $He_4$ ) تتكون بكميات هائلة في الشمس والنجوم، حيث تندمج أربعة من ذرات الهيدروجين مكونين نواة ذرة الهيليوم ( $He_4$ ) ، وخلال ذلك التفاعل يتحول ٢ من البروتونات ليصبحا نيوترونين ويتولد جسيم ألفا والشكل رقم (٢) يوضح انبعاث جسيم ألفا ، ولذي ينتج من تحول نواة غير مستقرة مثل نواة ذرة الراديوم ( $Ra_{226}$ ) والتي تتحول الى نواة مستقرة والتي تسمى النواة الوليدة ( $Rn_{222}$ ) وجسيم ألفا . اول ما عرفت اشعة الفا عن طريق اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي للعناصر الثقيلة فوق اليورانيوم والبولونيوم. [٨]



الشكل رقم (٥) مخطط انبعاث جسيم ألفا [١]



الشكل رقم (٦) يوضح قدرة اختراق بعض انواع الاشعاعات للمادة [٢]

#### ٤- الأشعة السينية (X-ray) :-

هي أشعة كهرومغناطيسية ذات طول موجي يتراوح بين ( ١٠ ) بيكومتر حتى ( ١٠ ) نانومتر، والتي تعادل الترددات ما بين ( ٣٠ ) ميكا هرتز حتى ( ٣٠ ) إكسهايرتز وأما الطاقة فتتراوح ما بين ( ١٢ )

حتى (١٢٤٧). تستخدم الأشعة السينية بشكل واسع في التصوير الشعاعي وفي العديد من المجالات التقنية والعلمية اكتشفها العالم الألماني وليام رونتجن عام (١٨٩٥) في جامعة فورتسبورغ ، ونال عنها جائزة نوبل في الفيزياء في عام (١٩٠١) قام وليام رونتجن ، مكتشف الأشعة السينية، بتسليط شعاع إلكتروني داخل أنبوب زجاجي مطبق بين طرفيه توتر كهربائي مرتفع . كان هذا الأنبوب مفرغ من الهواء وتتطلق بداخله إلكترونات من قطب كهربائي سالب إلى قطب كهربائي موجب. أحيط هذا الأنبوب بورق ذو لون فاتح لحماية المستخدم من المجال الكهرومغناطيسي المنبعث ووضعت شاشة فسفورية في نهايته عندما اصطدم الشعاع الإلكتروني بالشاشة بدأت بالتوهج. عندما وضع ريتشارد رونتجن يده بالصدفة بين الأنبوب والشاشة الفسفورية شاهد صورة لعظام يده على الشاشة، وكانت هذه أول عملية تصوير بالأشعة السينية. [١٩]

تستخدم الأشعة السينية في العديد من المجالات ، في الطب للكشف عن الأسنان والعظام وكسورها وتحديد مواقع الأجسام الصلبة مثل الشظايا أو الرصاص في الجسم، وكذلك الكشف عن الأورام في الجسم، بفضل هذه الأشعة أصبح من الممكن رؤية الكسور العظمية بدقة عالية حيث تستطيع هذه الأشعة اختراق الأجسام اللينة مثل الجلد ولكنها لا تستطيع المرور عبر العظام، مما يؤدي لظهور صورة الأخيرة كما في الشكل رقم (٧). من أهم ما يميزها هو قلة أضرارها الجانبية. [٦]




الشكل رقم (٧) يوضح قدرة اختراق بعض انواع الاشعاعات لالاسنان والعظام [٢]

أيضاً يستخدم الأطباء هذه الأشعة في علاج الأورام السرطانية والقضاء عليها. فالأشعة السينية تميت الخلايا السرطانية وتقضي عليها، أما خلايا الجسم السليمة فهي تستعيد حيويتها بعد فترة قليلة وتعود سليمة معافاة. [١٧]



الشكل رقم (٨) يوضح قدرة اختراق بعض انواع الاشعاعات للكشف عن السرطانات [٤]

استخدمت الأشعة السينية أيضاً في الصناعة لكشف الهنات والشقوق في القوالب المعدنية والأخشاب المستعملة في صناعة الزوارق، كما ساعدت دراسة طيف امتصاص هذه الأشعة في المادة على جعل الأشعة السينية طريقة لكشف العناصر الداخلة في تركيب المواد المختلفة وتحليلها. وتستعمل في هذه الحالة الأشعة السينية التي تميز كل عنصر من العناصر الكيماوية. وقد بات من الممكن قياس سماكة المواد الصلبة ومسح القطع الصناعية بحثاً عن عيوب التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة بواسطة هذه الأشعة. [١٨]



الشكل رقم (٨) يوضح قدرة الاشعة السينية على الكشف عن الهنات والثقوب [١٢]

في مجال الأمن تستخدم الأشعة السينية في مراقبة حقائب المسافرين في المطارات بحثاً عن أسلحة أو قنابل في علم دراسة الأجسام الصلبة إذ انه باستخدام حيود الأشعة السينية اتضح وجود تناظر معين في بعض أنواع الجوامد (البلورات) وكانت تلك بداية انطلاقة جبارة في دراسة خصائص الجوامد والتركيب البلوري، ومعرفة التركيب الذري للعناصر. [٨]

في مجال الفن استخدمت للتعرف على أساليب الرسامين والتمييز بين اللوحات الحقيقية واللوحات المزيفة، وذلك لأن الألوان المستعملة في اللوحات القديمة تحتوي على كثير من المركبات المعدنية التي تمتص الأشعة السينية، وأما الألوان المستعملة في اللوحات الحديثة فهي مركبات عضوية تمتص الأشعة السينية بنسبة أقل. [١٠١]



الشكل رقم (٩) يوضح استخدام الاشعة السينية في المجال الطبي[٩]

#### ١-٤-٢ الاشعاع الغير مؤين :-

هو نوع من الاشعاعات التي لا تستطيع تأيين الذرات أو الجزيئات للوسط المادي المار فيه لعدم امتلاكها طاقة كافية ، فهي غير قادرة على إزالة الإلكترونات ولكنها قادرة على جعلها تهتز في مكانها ، مما يرفع من درجة حرارة الجسم. ويتميز بانه يتكون من موجات منخفضة الطاقة والتردد ومرتفعة الطول الموجي ، وعادة ما يفضل استخدام الإشعاع غير المؤين في مختلف التطبيقات لعدم قدرته على التغيير في الذرات والجزيئات والتفاعل معها، ولعدم قدرته على التسبب بالطفرات الوراثية ولكن هذه الإشعاعات قادرة على رفع درجة حرارة الأنسجة بما يتسبب في تلفها، كما أنها تتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية المزروعة داخل الجسم، كأجهزة تنظيم ضربات القلب. ويقسم الاشعاع الغير مؤين الى انواع عدة منها :-

١- الاشعة الراديوية : هي نوع من الموجات الكهرومغناطيسية مع أطوال موجية في الطيف

الكهرومغناطيسي أطول من ضوء الأشعة تحت الحمراء موجات الراديو لها ترددات تتراوح بين


(٣٠ هرتز) عند تردد (٣٠٠ هرتز) ، يبلغ الطول الموجي المقابل (١ملم) ، وعند يبلغ الطول الموجي (١٠٠٠٠كم) . مثل كل الموجات الكهرومغناطيسية الأخرى، تنتقل الموجات الراديوية بسرعة الضوء في الفراغ. تولد بواسطة الشحنات الكهربائية التي تخضع للتسارع ، مثل التيارات الكهربائية المتغيرة مع الزمن تصدر موجات الراديو التي تحدث بشكل طبيعي عن طريق البرق والأجرام الفلكية. [١٢]

تتولد موجات الراديو بشكل مصطنع بواسطة أجهزة الإرسال وتستقبل بواسطة أجهزة الاستقبال اللاسلكية باستخدام الهوائيات تستخدم الموجات الراديوية على نطاق واسع في التكنولوجيا الحديثة للاتصالات الراديوية الثابتة والمتنقلة والبيث اللاسلكي والرادار وأنظمة الملاحة اللاسلكية والأقمار الصناعية للاتصالات وشبكات الكمبيوتر اللاسلكية والعديد من التطبيقات الأخرى. تتميز الترددات المختلفة للأمواج الراديوية بخصائص انتشار مختلفة في الغلاف الجوي للأرض؛ فيمكن أن تنحرف الموجات الطويلة حول عوائق مثل الجبال وتتبع محيط الأرض تسمى الموجات الأرضية، ويمكن أن تنعكس الموجات القصيرة عن الأيونوسفير الغلاف الأيوني وتعود إلى الأرض من الأفق تسمى الموجات السماوية، بينما تنحرف أطوال الموجات الأقصر بكثير أو تخفت وتنتقل على طول البصر، الانتشار الأفق المرئي. لمنع التداخل بين مختلف المستخدمين، يخضع توليد الموجات اللاسلكية واستخدامها اصطناعيا لتنظيم خط لذلك تقتصر مسافات على صارم بموجب القانون، بتنسيق من هيئة دولية تسمى الاتحاد الدولي للاتصالات (ATU)، الذي يُعرف الموجات الراديوية بأنها موجات كهرومغناطيسية من الترددات الأقل من (٣٠٠٠ كيلو هرتز) ، التي تنتشر في الفضاء دون دليل صناعي وينقسم الطيف اللاسلكي إلى عدد من النطاقات الراديوية على أساس التردد، وهو مخصص لاستخدامات مختلفة. [١٠]

٢- **موجات الميكروويف (Microwave Waves)** : هي موجات كهرومغناطيسية ذات طول موجة قصير بين الموجات الراديوية والأشعة تحت الحمراء. أي أنها تشمل نطاق الأشعة بطول موجة من (١سم) إلى الأشعة الملي مترية ، ويحدها الموجات الراديوية من أسفل ذات طول موجة أكبر) ، كما تحدها الأشعة تحت الحمراء التي تحدها طيف الضوء المرئي من أعلى ذات طول موجة أصغر هذا معناه أن اسم تلك الأشعة بالميكروويف يدل على صغر طول موجتها وهذا ماتم توضيحه في الشكل رقم (٥). ونلاحظ أن طول الموجة يتناسب عكسيا مع ترددها ، وثابت التناسب هو سرعة الضوء. [٢]

تتميز هذه الموجات بأنها تعطي حرارة عند اختراقها لنسيج خلوي، ولذلك تم استخدام هذه الأشعة الصناعة الأفران سريعة التسخين والتي تسمى بأفران المايكروويف تستخدم الموجات الصغيرة في الرادار وفي فرن ميكروويف وفي البلازما ، وفي تقنية الاتصالات ، والهاتف المحمول والبلوتوث والبيث التلفزيوني

. كما يحاول استخدامها كسلاح في الحرب ومن المكونات الرئيسية لمعجل إلكتروني يستعمل رنان للموجات الصغيرة. فيه تُعجل الإلكترونات عن طريق مجالات كهربائية ناشئة عن موجات كهرومغناطيسية ساكنة. يمكن بواسطتها إنتاج مجالات كهربائية تصل شدتها إلى (30mv) لكل متر. ويحدد طول الخلية الواحدة في المعجل بحيث أن ينعكس المجال المغناطيسي للموجة بمجرد أن ينفذ الإلكترون منه فيزداد تسريعه. وهكذا يمرق الإلكترون من خلية إلى خلية وتزيد سرعته حتى يصل في بعض المعجلات إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء. بعد ذلك يمكن إجراء التجارب العلمية على هذه الإلكترونات السريعة. [٤]



الشكل رقم (١٠) يوضح موقع نطاق الأشعة الميكرووية ، بين الأشعة الراديوية والأشعة تحت الحمراء في طيف الموجات الكهرومغناطيسية [٦]

٣- الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation) : هو الإشعاع الكهرومغناطيسي مع الطول الموجي بين (٠/٧) و (٣٠٠) ميكرومتر، وهو ما يعادل تقريبا نطاق الترددات بين ٤٠٠ تيرا هيرتز طول موجته أطول وتردده أدنى من الضوء المرئي، ولكن طول موجي أقصر والتردد العالي) من تلك الموجات من الإشعاع التيراهيرتز . ضوء الشمس الساطع يوفر من حوالي ١ كيلو وات لكل متر مربع عند مستوى سطح البحر، ومن هذه الطاقة ، ( ٥٢٧ ) واط هو ضوء الأشعة تحت الحمراء، و (٤٤٥) واط من الضوء المرئي، و (٣٢) واط من الأشعة فوق البنفسجية. [٦]

إن التصوير بالأشعة تحت الحمراء يستخدم على نطاق واسع في الأغراض العسكرية والمدنية وتشمل التطبيقات العسكرية الاستحواذ على الأهداف، والمراقبة، للرؤية الليلية، وتعقب صاروخ موجه أما الاستخدامات غير عسكرية فتشمل تحليل الكفاءة الحرارية، ودرجة الحرارة والاستشعار عن بعد ولفترة قصيرة تراوحت الاتصالات اللاسلكية، والتحليل الطيفي، والتنبؤ بالأحوال الجوية في علم الفلك تستخدم الأشعة تحت الحمراء في المقارِب المزودة بأجهزة استشعار لاخترق مناطق الغبار في الفضاء، مثل

السحب الجزيئية ؛ كشف أجسام باردة مثل الكواكب يشع الإنسان في درجة حرارة الجسم الطبيعي أساسا على طول موجي حوالي ( ١٠ نانومتر) على المستوى الذري ، مما يجعلها مفيدة لطائفة وتردد دراسة هذه الدول الطاقة للجزيئات من التماثل السليم. مطياف الأشعة تحت الحمراء يدرس امتصاص ونقل فوتونات في مدى الأشعة تحت الحمراء والطاقة وبناء على وتيرة وحدة الأشعة تحت الحمراء وتستخدم في معدات الرؤية الليلية عندما يكون هناك عدم كفاية الضوء المرئي لنرى تعمل أجهزة الرؤية الليلية من خلال عملية تنطوي على تحويل فوتونات الضوء المحيط إلى إلكترونات تضخم بعد ذلك بعمليات كيميائية وكهربائية ثم تحويلها مرة أخرى إلى ضوء مرئي مصادر الأشعة تحت الحمراء ضوء يمكن أن تستخدم لزيادة الضوء المحيطة المتاحة للتحويل عن طريق أجهزة للرؤية الليلية كما في الشكل رقم (٦) ، وزيادة وضوح ، في الظلام دون فعليا باستخدام مصدر الضوء المرئي. وينبغي استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء وأجهزة رؤية ليلية لا يمكن الخلط بينه وبين التصوير الحراري التي تخلق صوراً على أساس الاختلافات في درجة الحرارة السطحية عن طريق الكشف عن الأشعة تحت الحمراء (الحرارة) التي تنبعث من الأجسام والبيئة المحيطة بها. [٨]



الشكل رقم (١١) يوضح التصوير الليلي باستخدام الأشعة تحت الحمراء [٩]

٤- الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Rayes) : هي موجة كهرومغناطيسية ذات طول موجي أقصر من الضوء المرئي لكنها أطول من الأشعة السينية سميت بفوق البنفسجية لأن طول موجة اللون البنفسجي هو الأقصر بين ألوان الطيف وطول موجاتها يبدأ من ١٠ نانومتر إلى ٤٠٠ نانومتر، وطاقتها تبدأ من ٣ إلى ١٢٤ إلكترون فولت. [١]

وتوجد أشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس، وتنبعث بواسطة النجوم الكهربي أو الضوء الأسود. وكما هي أشعة مؤينة أي تفصل الإلكترونات عن ذراتها فقد تسبب تفاعلا كيميائيا، وتجعل العديد من المواد متوهجة أو مسفرة. وقد أدرك الكثير من الناس تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجسم مسببة حالات من

ضربة الشمس، ولكن طيف تلك الأشعة لها تأثيرات أخرى قد تكون مفيدة أو مضرّة لصحة البشر. كان اكتشاف الأشعة فوق البنفسجية متعلقاً بمشاهدة علمية بأن أملاح الفضة تصبح داكنة أكثر بعد تعرضها لضوء الشمس. ففي عام ( ١٨٠١ ) لاحظ الفيزيائي الألماني جون فيلهلم ريتز أن أشعة غير مرئية ، طول موجتها أقصر من اللون البنفسجي التي هي نهاية الطيف المرئي ناجحة بشكل خاص في زيادة دكّانة لون ورق الفضة المشبع بالكوريد فقام بتسميتها "الأشعة المؤكسدة" ليشدد على تفاعلها الكيميائي ولتمييزها عن "الأشعة الحارة" التي هي بالطرف الآخر من الطيف. تم اعتماد الاسم الأشعة الكيميائية بعد ذلك بفترة وجيزة وبقي هذا الاسم قيد الاستعمال خلال القرن التاسع عشر. في نهاية الأمر سقط من الاستعمال التعبيران أشعة كيميائية وأشعة حارة واستعمل التعبيران الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء على التوالي. تسمى الأشعة فوق بنفسجية ما تحت ٢٠٠ نانومتر بالفراغية لأن الهواء يمتصها بقوة، وقد اكتشفها الفيزيائي الألماني فيكتور شومان عام ١٨٩٣. [٢]

## ١-٥- الكشف عن الإشعاع :-

نظراً لطبيعية الإشعاع غير المرئية كان لابد من إيجاد الطرق والأدوات الملائمة للكشف عن الإشعاع وقياسه وكذلك بما أن الهدف الرئيسي للوقاية الإشعاعية هو معرفة وقياس الإشعاع وتوفير المعلومات اللازمة عنه ومعرفة مقدار ما قد يحدثه من آثار سلبية على الإنسان والبيئة بالإضافة الى تقدير ضرورة إجراء هذه القياسات ودرجة ملائمة الأجهزة لنوع القياس . وذلك لغايات تخفيض الجرعات الإشعاعية تستخدم الكواشف النووية لكشف الجسيمات والفوتونات التي تنبعث من أنوية المواد المشعة وهذه الكواشف تعتمد في عملها على عمليات التأين التي تحدثها الجسيمات والفوتونات المشعة أثناء اجتيازها للمادة وتتوقف على:

### ١ - طبيعة المادة.

### ٢- نوع الإشعاع و طبيعته و شدته.

وتسمى المواد التي تتأثر بالإشعاع بشكل يمكن معه ( الاستفادة من الأثر الناتج ) بكواشف الإشعاع . حيث تنقسم الكواشف الإشعاعية إلى ثلاثة أنواع


### ١-٥-١ الكواشف المملوءة بالغاز : هو أحد كواشف الإشعاع وطبيعة عمله تعتمد على انواع خاصة

من الغاز تدخل في تركيب هذه الكاشف والية عمله تعتمد على دخول الإشعاع وبالتالي يعمل على تأين جزيئات الغاز الواقعة في مسار ذلك الإشعاع حيث يقسم هذه النوع من الكواشف الى ثلاثة انواع : [٧]

**أولاً: غرفة التأين :** ان امتصاص الإشعاع في الغازات يؤدي إلى إنتاج أزواج أيونية (Ion Pairs) التي هي عبارة عن أيونات سالبة الشحنة (إلكترونات) وأيونات موجبة الشحنة (بقية الذرة). وإحداث تآين لجزيئات الغاز فإنه من الضروري أن يعطي الجسم الساقط طاقة على الأقل تكون مساوية لطاقة التآين لجزيئات الغاز ليسمح لعملية التأين بالحدوث. [١٩]

فعند تسليط فرق جهد متوسط بين لوحين متقاربين تنجذب الأيونات الموجبة نحو القطب السالب والذي يسمى المهبط Cathode والأيونات السالبة نحو القطب الموجب والذي يسمى المصعد Anode. وعلى هذا الأساس سيكون سيلاً من الإلكترونات، هذا السيل من الإلكترونات سيكون تياراً كهربائياً ١٠ يمكن تكبيره باستخدام دائرة إلكترونية حساسة تسمى التيار المستمر DC (Amplifier) ومن ثم يمكن استخدامه كدليل للكشف عن الإشعاع. [٨]

**ثانياً : - العداد التناسبي :** الزيادة في فرق الجهد تؤدي إلى إحداث ظاهرة التضاعف للغاز Gaz Multiplication الأمر الذي يساعد على تسريع الإلكترونات الناتجة عن التآين إلى طاقة عالية تمكنها من القيام بتآينات أخرى قبل أن تصل إلى المصعد فينتج عن ذلك عدة مراحل من التآين الثانوي (Secondary Ionization) هذه العمليات تسهل معرفة حركة الفوتون أو الجسم المتآين عن طريق النبضات الكهربائية (Electrical Pulses) التي تكون كبيرة لدرجة أنه من السهل كشفها. وبعد فترة زمنية عند تجاوز مدى معين من فرق الجهد يصبح حجم النبضة (Pulse) متناسباً مع كمية الطاقة المترسبة بواسطة الجسيمات الأصلية أو الفوتونات لذا سمي بالعداد التناسبي. [٧]




الشكل رقم (١٢) يوضح العداد التناسبي [٩]

**ثالثاً: كاشف غايغر - مولر :** هذا النوع من الكواشف الإشعاع عبارة عن العداد التناسبي، ولكن يختلف عنه في زيادة فرق الجهد مما يؤدي إلى إحداث ظاهرة التضاعف للغاز بصورة أكبر من العداد التناسبي حيث يسبب الأيون الواحد تأيناً هائلاً يؤدي إلى نبضات كبيرة جداً من التيار. تؤدي زيادة الجهد العالي ما بعد منطقة التناسب يتم التوصل إلى نهاية منطقة التناسب لتبدأ منطقة غايغر. عند هذه النقطة حجم جميع

النبضات بغض النظر عن طبيعة الجسيم المؤين الابتدائي تكون متماثلة لا يكتشفون كل جسيم ، حيث يمكن لبعض الإشعاع أن يمر دون إنتاج تأين كاف لاكتشافه . سيكون الكاشف غير قادر على التفريق بين الأنواع المختلفة من الإشعاع. [٢٠]


إذا تمت زيادة فرق الجهد إلى مقدار عالي، فسوف تبدأ آلية التفريغ المستمر (Continuous Discharge) داخل الأنبوب عملية التفريغ المستمر هذه ضارة بالأنبوب إن استمرت لأي فترة من الزمن. وعلى هذا يجب خفض الجهد مباشرة. [٨]



الشكل رقم (١٢) يوضح كاشف غايغر - مولر [٩]

١-٥-٢ كواشف الحالة الصلبة : إن انتقال الطاقة من الفوتون أو الجسيم المشحون إلى أحد إلكترونات التكافؤ ( Valence Electrons ) ربما يرفعه من مستوى التكافؤ إلى مستوى التوصيل وبالتالي سيترك الإلكترون فجوة Hole وهذه الفجوة تحمل شحنة موجبة وهي تشبه الأيون في الحالة الغازية المثارة والمتأينة. ويسمى هنا الإلكترون والفجوة ( Electron-hole air ) ويمكن وضع شوائب في المادة التي تكون فيها المسافة بين مستوى التوصيل ( Conduction Level ) ومستوى التكافؤ ( Valence Level ) كبيرة نوعاً ما وليست كبيرة جداً كما في المواد العازلة ولا محدودة أو صغيرة جداً كما في المواد الناقلة ( Conductor ) ، لذا تسمى هذه المواد انصاف نواقل وظيفتها الشوائب هي تكوين مستويات بينية بين كلاً من منطقة النقل ومنطقة التكافؤ وذلك لتقليص المسافة بينهما مما يساعد على تحريك الإلكترون من مكانه واقترابه من عصابة النقل مما يساعد على النقل في هذه الحالة، وعلى هذه تعتمد عدادات الحالة الصلبة . فهي إذا مكونة من قطعتين هما ( n-type ) وأغلبتها إلكترونات و ( p-type ) وأغلبها فجوات . كما موضح في الشكل رقم (٧) [٦]

هاتان القطعتان متصلتان مع بعضهما البعض لتكون ما يعرف بوصلة ( P-N Junction ) فعند التوصيل تنتقل الإلكترونات من القطعة السالبة إلى القطعة الموجبة العكس بالنسبة للفجوات مما يؤدي إلى تكون منطقة نضوب بينهما. [٥]




الشكل رقم (١٣) يوضح مناطق جهاز كشف الإشعاع للحالة الصلبة [٤]

### ١-٥-٣ الكواشف الوميضية

الكاشف الوميضي عبارة عن محول يقوم بتحويل الطاقة الحركية للجسيم الساقط إلى ومضة ضوئية. حيث يعتبر كشف الإشعاع المؤين بواسطة الضوء الوميضي (Scintillation Light) المنبعث من أقدم الأساليب المعروفة في ذلك. [٢٠]

الضوء يتم توضيحه إلكترونياً باستخدام أنبوب التضاعف الضوئي والتي يمكن ترتيب نبضته الخارجة وعدها تؤدي غالبية عمليات تصادم الأشعة المؤينة (Ionizing Radiation) مع الذرات إلى تأين حيث ينتج عن كل عملية تأين زوج إلكترون - أيوني واحد فقط (electron-ion pair). وفي أحوال أخرى قد تكون الطاقة الحركية التي أكتسبها الإلكترون المداري كبيرة نسبياً وينتج عن ذلك سلسلة من عمليات التأين. [٩]



الشكل رقم (١٤) يوضح الكواشف الوميضية [٩]

## الفصل الثاني

# تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسي على صحة الانسان

## ٢-١ مقدمة :

يُعدّ الإشعاع الكهرومغناطيسي أحد الظواهر الفيزيائية الأساسية التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من البيئة الطبيعية والصناعية التي يعيش فيها الإنسان المعاصر، إذ يتواجد في كل مكان تقريباً، بدءاً من ضوء الشمس الذي يُعد المصدر الطبيعي الأهم للطاقة، وصولاً إلى التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل الهواتف المحمولة، شبكات الاتصال اللاسلكي، أجهزة الرادار، والأجهزة الطبية التشخيصية. ومع التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاعتماد المتزايد على وسائل الاتصال الحديثة، أصبح الإنسان محاطاً بمجالات كهرومغناطيسية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، مما أثار اهتمام الباحثين والعلماء حول طبيعة هذا الإشعاع وتأثيراته المحتملة على الصحة العامة. [١٧]

إن الإشعاع الكهرومغناطيسي هو شكل من أشكال الطاقة ينتقل عبر الفضاء على هيئة موجات تختلف في طولها الموجي وترددها، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين: الإشعاع غير المؤين الذي يمتاز بطاقة منخفضة نسبياً ولا يمتلك القدرة على إحداث تغييرات مباشرة في البنية الذرية للمادة، مثل موجات الراديو والميكروويف والأشعة تحت الحمراء؛ والإشعاع المؤين الذي يتمتع بطاقة عالية قادرة على كسر الروابط الذرية داخل الخلايا وإحداث تغييرات في المادة الحية، مثل الأشعة السينية وأشعة غاما. ويُعد هذا التمييز أساساً في فهم طبيعة التأثيرات البيولوجية المحتملة لكل نوع من أنواع الإشعاع. [١٨]


وقد أصبح موضوع تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي على صحة الإنسان من القضايا العلمية والصحية المهمة في العقود الأخيرة، خصوصاً مع التوسع الكبير في استخدام الأجهزة الإلكترونية وانتشار الأبراج الخلوية وشبكات الإنترنت اللاسلكي في البيئات السكنية والتعليمية والصناعية. فقد أثارت بعض الدراسات تساؤلات حول ما إذا كان التعرض المستمر للمجالات الكهرومغناطيسية منخفضة الشدة قد يرتبط بآثار صحية طويلة الأمد، مثل اضطرابات النوم، الصداع، الإرهاق، أو حتى التأثيرات المحتملة على الجهاز العصبي، في حين تؤكد دراسات أخرى أن مستويات التعرض اليومية ضمن الحدود المسموح بها دولياً لا تشكل خطراً صحياً واضحاً. [١٩]

ومن جهة أخرى، فإن الإشعاع المؤين يُعد أكثر خطورة من الناحية الصحية نظراً لقدرته على إحداث تلف مباشر في الخلايا والحمض النووي (DNA)، مما قد يؤدي إلى طفرات جينية أو زيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان عند التعرض المفرط أو غير المنضبط له. لذلك، تولي المؤسسات الصحية والهيئات الدولية اهتماماً كبيراً بوضع معايير وضوابط تحد من مستويات التعرض لهذا النوع من الإشعاع، خاصة في المجالات الطبية والصناعية. [٢٠]

## ٢-٢ تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي في مجال الطب

يلعب الإشعاع الكهرومغناطيسي دورًا أساسيًا في الطب الحديث، إذ يُستخدم في التشخيص والعلاج ومتابعة تطور الأمراض. ومن أبرز تطبيقاته الطبية:

١- **التشخيص الطبي**: تُستخدم الأشعة السينية (X-Ray) على نطاق واسع في تشخيص العديد من الأمراض، حيث تساعد في تصوير العظام وبعض الأعضاء الداخلية. كما تُستخدم في تصوير الجهاز الهضمي بعد إعطاء المريض مادة ظليلة مثل الباريوم، مما يسمح للطبيب برؤية المريء والمعدة والأمعاء بوضوح.



### الشكل رقم (١٥) يوضح التشخيص الطبي [١١]

٢- **التصوير المقطعي المحوسب (CT Scan)**: يعتمد هذا الفحص على الأشعة السينية لإنتاج صور مقطعية دقيقة لأعضاء الجسم. ويساعد في تشخيص الأورام أو الالتهابات أو النزيف في أعضاء الجهاز الهضمي مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.



الشكل رقم (١٦) يوضح التصوير المقطعي المحوسب [١٢]

٣- العلاج الإشعاعي : يستخدم الأطباء أشعة غاما أو الأشعة السينية عالية الطاقة لعلاج بعض أنواع السرطان. حيث يتم توجيه هذه الأشعة لتدمير الخلايا السرطانية أو إيقاف نموها، خاصة في حالات سرطان المعدة أو القولون أو الكبد.



الشكل رقم (١٧) يوضح العلاج الإشعاعي [١٣]

٤- التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) : يعتمد هذا النوع من التصوير على الموجات الكهرومغناطيسية والمجالات المغناطيسية لإنتاج صور دقيقة للأعضاء الداخلية دون استخدام الإشعاع المؤين، مما يجعله أكثر أماناً في بعض الحالات الطبية. [٥]




الشكل رقم (١٨) يوضح التصوير بالرنين المغناطيسي [١٤]

## ٣-٢ تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي في دراسة وتشخيص أمراض الجهاز الهضمي

يُعد الجهاز الهضمي من أكثر الأجهزة التي تستفيد من تقنيات الإشعاع الكهرومغناطيسي في التشخيص، ومن أهم التطبيقات:

- ١- تصوير المريء والمعدة بالباريوم : يتم إعطاء المريض محلول الباريوم ثم تُستخدم الأشعة السينية لتصوير حركة المادة داخل المريء والمعدة، مما يساعد في اكتشاف القرحة، أو التضيق، أو الأورام.




الشكل رقم (١٩) يوضح تصوير المريء والمعدة بالباريوم [١٥]

- ٢- تصوير الأمعاء الدقيقة والغليظة : تُستخدم الأشعة السينية أو التصوير المقطعي لفحص الأمعاء والكشف عن الالتهابات، الانسدادات، أو الأورام.




الشكل رقم (٢٠) يوضح تصوير الأمعاء الدقيقة والغليظة [١٦]

٣- تشخيص أمراض الكبد والبنكرياس : تساعد تقنيات مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي في اكتشاف أمراض الكبد مثل التليف أو الأورام، وكذلك أمراض البنكرياس والمرارة.



الشكل رقم (٢١) يوضح تشخيص أمراض الكبد والبنكرياس [١٧]


٤- الكشف المبكر عن السرطان : يساهم الإشعاع الكهرومغناطيسي في الكشف المبكر عن سرطانات الثدي والجهاز الهضمي مثل سرطان القولون أو المعدة، مما يزيد من فرص العلاج والشفاء. [٨]



الشكل رقم (٢٢) يوضح الكشف المبكر عن السرطان [١٣]

## ٢-٤ التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين :


يتم في معظم اجزاء وانسجة الجسم البشري تجدد الخلايا الحية ، حيث تموت بعض الخلايا ويتم تعويضها بتكوين خلايا حية جديدة حتى يستطيع النسيج او العضو ان يقوم بوظيفته الحيوية ، وعند تعرض الانسجة والاعضاء الى جرعات عالية من الاشعاع يموت عدد كبير من خلاياه ، ولا تستطيع اعادة عملية بناء الخلية الجديدة تعويض العدد الكبير المفقود من الخلايا وبالتالي يحدث نقص كبير في خلايا العضو أو النسيج الأمر الذي يؤدي الى فقد العضو او النسيج الوظائف الاساسية فاذا كان النسيج اساسي يكون الموت حتميا لهذه الكائن ومن امثلة هذه التأثيرات الحتمية المرض المعروف بالمرض الاشعاعي ، عتام عدسة العين وهو المرض المعروف باسم المياه البيضاء والارثيميا او احمرار الجلد وغيرها :-



الشكل رقم (٢٣) يوضح التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين [١٢]

## ٢-٤-١ تلف الجهاز المركزي العصبي :-

عموما لا توجد بيانات كافية عن الانسان حول حد الجرعة التي يبدأ عندها تلف الجهاز العصبي المركزي ، الا ان النتائج التجريبية على الحيوانات اثبت ظهور اعراض تدل على حدوث بعض التلف في الجهاز العصبي المركزي ، وذلك عند جرعات عالية جدا لذلك تسمى هذه المنطقة من الجرعات التي تزيد عن حوالي (٣٠) غراي بمنطقة الجهاز العصبي المركزي ، ومع ذلك فقد ثبت ان الوفاة لا تتم عن هذه الجرعات في الحال، حتى بالنسبة للحيوانات التي تعرضت لما يزيد عن (٥٠٠) غراي . [٧]



الشكل رقم (٢٤) يوضح تلف الجهاز المركزي العصبي [١٥]

## ٢-٤-٢ الإريثيما :

هنالك تأثير اخر يظهر بمجرد التعرض الى الجرعات العالية للاشعاع ويعرف هذه التأثير بالاريتيما ( وهو عبارة عن احمرار الجلد والجلد معرض التعرض الاشعاعي أكثر من اي نسيج اخر في الجسم وخصوصا بالنسبة للاشعة السينية ذات الطاقة المنخفضة وللاكترونات لذلك فان التعرض الجرعة مقدارها (٣) غراي من الاشعة السينية ذات الطاقة المنخفضة يؤدي الى حدوث الاريتيما وعند زيادة الجرعة يمكن ان تظهر اعراض اخرى كالحروق والتقيحات وغيرها . [٨]



الشكل رقم (٢٥) يوضح الإريثيما [١٩]

## ٢-٥- السرطان :

يمكن لتلقي جرعة عالية من الأشعة أن يزيد من خطر السرطان بسبب تضرر الحمض النووي في الخلايا التي لم تمت بسبب الأشعة. ولكن، تعد الأشعة سبباً أقل خطورة للإصابة بالسرطان مما قد يعتقد الكثير من الناس حتى وإن تعرض كامل الجسم لجرعة من الأشعة تبلغ ٥٠٠ ميلي غراي وهي جرعة تفوق بخمسائة ضعف الجرعة السنوية الوسطية الناجمة عن الإشعاعات الخلفية فإن الزيادة في خطر الوفاة بسبب السرطان طيلة الحياة تتراوح بين ٢٢-٢٤,٥%، وبخطر مطلق أكيد لا يزيد عن ٢,٥. [٩]


يكون خطر الإصابة بسرطان بسبب الأشعة أعلى بعدة أضعاف عند الأطفال أو الأجنة بالمقارنة مع البالغين. قد يكون الأطفال أكثر عرضةً لذلك الخطر بسبب ارتفاع وتيرة الانقسامات الخلوية لديهم، وطول الفترة المتوقعة للحياة والتي يمكن للسرطان أن يتطور في أثنائها بناءً على ذلك، فإن الخطر الإجمالي للوفاة لاحقاً بالسرطان لطفل يبلغ من العمر سنة واحدة وأجري له تصوير بطن بالتصوير المقطعي المحوسب (CT) قد يزداد بنسبة ٠,١% فقط لطيلة حياته. وقد أدت المخاوف التي أثرت مؤخرًا بشأن مخاطر التصوير المقطعي المحوسب CT إلى جدل حول تكرار هذا النوع من التصوير عند المريض نفسه لمرات عديدة . وبسبب هذه المخاوف، فقد عملت الشركات المصنعة لأجهزة التصوير المقطعي المحوسب على تقليل جرعة الأشعة الصادرة عن هذه الأجهزة. كما إن الأطباء يحاولون عدم اللجوء للتصوير المقطعي المحوسب إلا عندما يكون أكثر دقة من بقية الاختبارات الأخرى التي تستخدم مقادير أقل من الأشعة أو لا تستخدم الأشعة إطلاقاً. في حال كان التصوير المقطعي المحوسب هو الاختبار الأدق قطعاً، فإن الخطر الناجم عن عدم تشخيص المرض بشكل صحيح نتيجة عدم استخدام الأشعة المقطعية يكون أكبر من خطر الأشعة المقطعية بحد ذاتها. [١٠]

## ٦-٢- انخفاض متوسط العمر :

هنالك بعض الحقائق من التجارب على الحيوانات ( التي تؤكد ان متوسط العمر ينخفض بالإضافة الى ذلك على المجموعات البشرية التي تعرضت الى جرعات عالية جدا من الاشعاعات ، ولقد اظهرت الاحصائيات التي تم اجراءها ان جرعة مقدارها سيفرت واحد تؤدي الى قصر مالا يزيد عن سنة واحدة من عمر الانسان . [٨]

## ٧-٢ التأثيرات البيولوجية للإشعاع الغير مؤين :

لا شك أن التكنولوجيا المحمولة ، التلفون المحمول والكمبيوتر المحمول وغيرهما أصبحت جزءا هاما في حياة كل فرد منا ، وازداد استخدامها حتى أصبحت محور الأنشطة والأعمال والاتصالات واقتبل الإنسان على استعمالها مندفعاً للاستفادة منها دون وعي لاحتماله مخاطرها الصحية . ومنذ سنوات مضت يؤكد القائلون على أن جهاز المحمول آمن، ولا خطر منه على صحة الإنسان، ويقولون أن معايير ومقاييس الموجات المستخدمة في شبكات المحمول تختلف عن موجات إرسال الراديو والتلفزيون من حيث قوتها ومن ثم فإن الأبحاث التي تؤكد خطورة موجات أبراج الإرسال الإذاعي والتلفزيون على صحة الإنسان غير وارده في هذا المجال . ولا يزال البعض حتى الآن يعتمدون أن تأثير موجات شبكات المحمول حراري فقط ان يرفع درجة حرارة النسيج المعرض لهذه الموجات ويتغافلون عن قصد أو غير قصد ان هنالك تأثيرات بيولوجية التعرض لهذه الموجات . ويمكن تصنيفها حسب مايلي -




الشكل رقم (٢٦) يوضح التأثيرات البيولوجية للإشعاع الغير مؤين [١٩]

## ٢-٧-١ امراض القلب والاعوية الدموية :-

انتهى البحث الذي اجراه الدكتور بروني وزملاؤه سنة ١٩٩٨ الى مايلي :


١. انه بعد فترة تعرض حوالي ٢٠ دقيقة الى الموجات المنبعثة من الهاتف النقال يحدث نقص مؤقت في عدد ضربات القلب.
٢. يزداد ضغط الدم بمقدار ١٠ ملم زئبق وذلك الان القلب والأوعية الدموية المتصلة به حساسان للموجات المنبعثة من الهاتف النقال من ثم يجب على المريض القلب او مريض الأوعية الدموية الحذر عند التعرض للموجات الكهرومغناطيسية . [٨]



الشكل رقم (٢٧) يوضح امراض القلب والاعوية الدموية [١٩]

## ٢-٧-٢ امراض الاطفال –


أثار عالم الفيزياء البريطاني جيراد هايلاند في بحث نشرته مجلة لا نست مخاوف كثيرة عن الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهواتف النقالة وقال ان الصبية الذين تقل اعمارهم عن ١٨ عاما أكثر عرضة لأثر الإشعاعات لأن أنظمة المناعة في أجسامهم اقل قوة من البالغين وهذه الاشعاعات لها تأثير على استقرار خلايا الجسم ، واهم اثارها على الجهاز العصبي وتسبب الصداع واضطرابات النوم وفقدان الذاكرة يقول العالم كولين بلا كمورد احد اختصاصي الجهاز العصبي بجامعة اكسفورد إذا كان من الممكن أن تسبب هذه الموجات مخاطر في المستقبل فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لتلك المخاطر نظرا لعدم تطور جهازهم العصبي بالإضافة لكثرة تعرضهم للإشعاع في صورة مبكرة. [٩]



الشكل رقم (٢٨) يوضح امراض الاطفال [٢٠]

### ٢-٧-٣ الصداع والقلق النفسي :-


اثبتت الدراسات أن أشعة الميكروويف لها بعض التأثيرات الضارة على صحة الإنسان ، تظهر أعراضها في صورة صداع وقلق نفسي مع الأرق وعدم القدرة على التركيز والشعور بالإعياء بصفة عامة ، ولقد اثبت أن التعرض لأشعة الميكروويف يمكن أن يكون له تأثير ضار على العين مثل الإصابة بمرض المياه البيضاء ، وذلك عند التعرض إلى هذه الأشعة بكثافات عالية تصل الى ١٠٠ ميلي وات . [١٠]



الشكل رقم (٢٩) يوضح الصداع والقلق النفسي [١٦]

## ٢-٧-٤ أورام الأذن :

اكتشفت دراسة أجراها معهد كارولينسكا السويدي على ٧٥٠ شخصاً ان خطر الإصابة بأورام العصب السمعي قد زاد بمعدل ٣,٩ مرة على الجانب الذي يسند عليه الهاتف النقال اثناء المكالمات الهاتفية . وفي المقابل لم تسجل أي زيادة في خطر الإصابة بأورام العصب السمعي على الجانب الآخر من الراس . لكن خطر الإصابة بصفة عامة لدى من يستخدمون الهواتف النقالة لأكثر من ١٠ سنوات لقد زاد بمعدل ١,٩ مرة . ويذكر ان ورم العصب السمعي هو نوع من الأورام الحميدة التي قد تحدث تلفاً في المخ والأعصاب. [١١]



الشكل رقم (٣٠) يوضح أورام الأذن [١٨]

# الفصل الثالث

## التلوث الإشعاعي

## الفصل الثالث

### التلوث الإشعاعي

#### ٣-١ مقدمة

يُعدّ التلوث الإشعاعي من أخطر أشكال التلوث البيئي التي واجهها الإنسان في العصر الحديث، نظرًا لطبيعته غير المرئية وتأثيراته العميقة والممتدة على الكائنات الحية والأنظمة البيئية. وقد برزت مشكلة التلوث الإشعاعي بشكل واضح مع التطور العلمي والتكنولوجي، خاصة بعد دخول الطاقة النووية في مجالات متعددة مثل توليد الكهرباء، والصناعة، والطب، والبحث العلمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة احتمالية التعرض للمواد المشعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. [١٥]

ويُقصد بالتلوث الإشعاعي انتشار أو وجود مواد مشعة في البيئة بمستويات تفوق الحدود الآمنة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى. وقد يكون هذا التلوث ناتجًا عن مصادر طبيعية مثل الإشعاعات الكونية والعناصر المشعة الموجودة في القشرة الأرضية، أو عن مصادر صناعية وبشرية كالمفاعلات النووية، والتجارب النووية، والنفايات المشعة، والحوادث الإشعاعية. ويكمن الخطر الحقيقي لهذا النوع من التلوث في قدرته على إحداث تغيرات بيولوجية على مستوى الخلايا والحمض النووي، قد تظهر آثارها بشكل فوري أو بعد فترات زمنية طويلة. [١٦]

لقد شكّلت حوادث نووية كبرى نقطة تحوّل في إدراك العالم لخطورة التلوث الإشعاعي، حيث أظهرت تلك الحوادث كيف يمكن لكمية كبيرة من المواد المشعة أن تنتشر في الهواء والماء والتربة، محدثة أضرارًا بيئية وصحية واسعة النطاق. ومن أبرز هذه الحوادث كارثة تشيرنوبيل التي وقعت في أوكرانيا عام ١٩٨٦، والتي أدت إلى تلوث مساحات شاسعة من الأراضي وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، وكذلك حادثة كارثة فوكوشيما في اليابان عام ٢٠١١ التي أعادت إلى الواجهة المخاوف العالمية من مخاطر الطاقة النووية. [١٧]


ولا تقتصر خطورة التلوث الإشعاعي على التأثيرات المباشرة فقط، بل تمتد إلى آثار غير مباشرة طويلة الأمد، مثل تلوث السلسلة الغذائية، وانتقال المواد المشعة عبر المياه والتربة إلى النباتات والحيوانات، ومن ثم إلى الإنسان. كما أن بعض النظائر المشعة تمتاز بعمر نصف طويل، ما يجعلها تبقى في البيئة لعقود أو حتى لآلاف السنين، مما يزيد من تعقيد مشكلة معالجتها والسيطرة عليها. [١٨]

ومع التقدم في المجالات الطبية، أصبح استخدام الإشعاع جزءًا أساسيًا في التشخيص والعلاج، مثل الأشعة السينية والعلاج الإشعاعي للأورام، إلا أن سوء الاستخدام أو التعرض غير المنضبط قد يسهم في

زيادة مستويات التلوث الإشعاعي، خصوصاً في حال غياب إجراءات السلامة والرقابة الفعالة. لذلك، أصبح من الضروري تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الإشعاع في خدمة الإنسان وبين الحد من مخاطره المحتملة. [١٩]

### ٢-٣ مصادر التلوث الإشعاعي :

تنتج المجالات الكهرومغناطيسية في المنازل بتشغيل الأجهزة والمعدات المنزلية الكهربائية. كما أن المنازل القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية أو ذات التوصيلات الكهربائية الغير سليمة من الممكن أن تكون ذات قيمة عالية للمجالات الكهرومغناطيسية فمن المؤكد أنه عند تشغيل أي جهاز منزلي كهربائي تولد مجال مغناطيسي فعندما يكون الشخص قريباً منه يتعرض لهذا المجال ويخترق جسمه مما قد يعرضه للخطر. ومن هذه الأجهزة مجففات الشعر وماكينات الحلاقة الكهربائية والسخانات وأفران الميكروويف والمكيفات ولمبات الفلورسنت وأجهزة التلفزيون وكل هذه الاجهزة تولد مجالاً كهرومغناطيسياً عالية بالقرب منا وتقل كلما ابتعدنا عنها لذا يجب ان يكون الشخص بعيداً عنها عند تشغيلها ويمكن تقسيم مصادر التلوث الى ماياتي :- [٢٠]



الشكل رقم (٣١) مصادر التلوث الإشعاعي [١٨]

### ٣-٢-١ التلوث الناتج عن الهاتف النقال :-

بدأ استخدام الهاتف النقال في السنوات الأخيرة ينتشر بسرعة مذهلة في كل دول العالم وبرغم من ذلك فإن الأبحاث التي أجريت لدراسة تأثير الاستعمال الدائم لهذه التكنولوجيا الحديثة ما زالت غير كافية كما أن الشركات التي تنتج وتسوق الهاتف النقال لا تعطي أي بيانات عن تأثيراته عند استخدامه فترات طويلة أو حتى قصيرة. ينبعث من الهاتف النقال الرقمي أشعة كهرومغناطيسية ترددها ٩٠٠ مليون هيرتز على شكل نبضات والنبضات المنبعثة من الهاتف النقال تصطدم بخلايا المخ ٢١٧ مرة كل ثانية مما يؤدي الى بعض الآثار المرضية التي يتعرى لها المستخدمون لهذا التليفون، حيث يتعرض هؤلاء المستخدمون لجهاز الجوال إلى نوعين من الطاقة الإشعاعية:

- ١- الطاقة الإشعاعية المباشرة من هوائي الجهاز (الاربال) وهذه الطاقة تؤدي الى اعطال في الاجهزة الالكترونية المختلفة مثل الحاسب الآلي واجهزة الاستقبال السمعية (جهاز الراديو) ويتركز تأثيرها في منطقة معينة (الراس) .
- ٢- الطاقة الكهربائية التي تنتقل بالحث : وهي الطاقة التي تنتقل نتيجة الجهد الكهربائي للجهاز وتتبعث بالتأثير من الجهاز الى الراس ويدي المحتث . وهذه تؤدي الى بعض الظواهر المرضية مثل الصداع والم في الجلد ورفة في العين وضعف في الذاكرة وطنين في الأذن ، كما يؤدي التعرض الاشعاعات المنبعثة من الجوال الى سرعة نبضات القلب وزيادة ضغط الدم . [١٢]



الشكل رقم (٣٢) التلوث الناتج عن الهاتف النقال [١٤]

### ٣-٢-٢ التلوث الناتج من ابراج التقوية الاذاعية على الذين يسكنون بالقرب منها :

في دراسة للموجة القصيرة بشواز سويسرا ، قام د لبيتر وزملاه عام ١٩٩٥ ، وأثبتنا علاقة سببيه من التعرض للموجات القصيرة لبرج تقوية إذاعي في هذه المدينة واضطرابات النوم وكذا نقص هرمون الميلاتونين والأخير أثبت أن منسوب الميلاتونين قد زاد عندما توقف البرج عن البث نهائيا بالمقارنة بما كان من قبل توقفه، وعند دراسة مستوى الهرمون أيضا على الأبقار زاد أيضا . [٢]

### ٣-٢-٣ التلوث الناتج عن اجهزة المنزل :-

تنتج المجالات الكهرومغناطيسية في المنازل بتشغيل الأجهزة والمعدات المنزلية الكهربائية. كما ان المنازل القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية أو ذات التوصيلات الكهربائية الغير سليمة من الممكن ان تكون ذات قيمة عالية للمجالات الكهرومغناطيسية فمن المؤكد انه عند تشغيل أي جهاز منزلي كهربائي يتولد مجال مغناطيسي فعندما يكون الشخص قريبا منه يتعرض لهذا المجال ويخترق جسمه مما قد يعرضه للخطر. ومن هذه الأجهزة مجففات الشعر وماكينات الحلاقة الكهربائية والسخانات وافران الميكروويف والمكيفات ولمبات الفلورسنت وأجهزة التلفزيون والخلطات ومجهرات الطعام والثلاجات غسالات ومجففات الملابس وأجهزة التليفون المحمول وصنع القهوة وهذه الأجهزة والمعدات الكهربائية تولد مجالات كهرومغناطيسية عالية بالقرب منها وتقل بسرعة كلما بعدنا عنها، لذا يجب ان يكون الشخص بعيدا عنها عند تشغيلها. أي ان درجة التلوث بالموجات الكهرومغناطيسية تزداد كلما اقتربنا من المصدر. [٣]




الشكل رقم (٣٣) التلوث الناتج عن اجهزة المنزل [١٦]

### ٣-٣ طرق الوقاية من الإشعاع المؤين:

عندما يُستخدم الإشعاع المؤين بصورة آمنة في الطب وإنتاج الطاقة والصناعة والبحوث، فإنه يجلب فوائد هائلة للناس. ومع ذلك، يجب تقييم مخاطر الإشعاع المحتملة والسيطرة عليها. وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معايير الأمان لحماية الصحة وتقليل الخطر على حياة الناس وممتلكاتهم المرتبطة بهذا الاستخدام. وتقسم طرق الوقاية في هذه النوع من الإشعاعات الى :

#### To reduce radiation exposure:



الشكل رقم (٣٤) طرق الوقاية من الإشعاع المؤين [١٧]

### ٣-٣-١ العمال في المجال النووي:

أدى تطور الصناعة النووية والتطبيق الأوسع انتشاراً للتكنولوجيات الإشعاعية والنووية إلى زيادة مطردة في عدد العمال الذين قد يتعرضون للإشعاع أثناء عملهم، ووفقاً لتقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري في عام ٢٠٠٨، يتعرض نحو ٢٣ مليون عامل في جميع أنحاء العالم مهنيًا للإشعاع المؤين. ومن بينهم، ثمة نحو ١٣ مليون شخص يعملون في مهن تنطوي على مصادر إشعاعات طبيعية و ١٠ ملايين شخص يعملون في مهن تنطوي على التعرض لمصادر إشعاعات من صنع الإنسان. وفي حين أن تعرضهم في معظمه يأتي نتيجة للتشغيل العادي للمرافق التي يعملون فيها، فقد يتعرضون أحياناً لإشعاعات مفرطة نتيجة لوقوع حادث.

ويمكن أن يتعرض العمال إما للإشعاع الاصطناعي أو المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية ولحمايتهم من مثل هذا التعرض يمكن اتخاذ بعض الخطوات الملموسة. ويشمل ذلك الرصد المنتظم أو معدات الحماية، أو التدابير المضادة مثل التدريب. ويُعد التدريب وتبادل المعلومات والرقابة الصحية المتسقة عوامل هامة أيضاً من أجل نظام فعال للوقاية من الإشعاعات المهنية. ويجب أن تسند أي من هذه المسؤوليات بوضوح للعامل أو المقاول أو صاحب العمل أو مشغل المرفق.

ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج يركز تحديداً على الوقاية من الإشعاعات المهنية. وهو يروج لاتباع نهج متسق دولياً إزاء هذه المسألة ويضع معايير ومبادئ توجيهية للأمان للحد من التعرض

للإشعاع في مكان العمل. كما أنه يساعد الدول الأعضاء على تطبيق هذه المعايير والمبادئ التوجيهية عملياً. [٦]

### ٣-٣-٢ المرضى:

أكثر من ٩٥ في المائة من الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها سكان العالم من مصادر صنعها الإنسان هي جرعات تنبع من حالات التعرض الطبي. وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منع تعرض المرضى للإشعاع غير الضروري وغير المقصود، مع ضمان أن تكون الجرعات الإشعاعية للمرضى متناسبة مع الغرض الطبي.

ووقاية المرضى من الإشعاعات عنصر أساسي في الممارسات الطبية الجيدة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الإجراءات الطبية التي تستخدم الإشعاع المؤين قد نما من نحو ١,٧ مليار في عام ١٩٨٠ إلى ٤ مليارات في عام ٢٠٠٧ والهدف من التعرض الطبي ليس إعطاء المريض أقل جرعة، وإنما إعطاؤه الجرعة التي تتناسب مع الغرض الطبي المقصود فعلى سبيل المثال، يجب على الممارس الطبي الإشعاعي إعطاء الجرعة الصحيحة للمريض لتشخيص الورم أو علاجه. وقد تنتج مشاكل جراء إعطاء جرعة منخفضة جداً أو مرتفعة جداً.

وما من شك أن تطبيق الإشعاع المؤين والمواد المشعة في التطبيقات التشخيصية والتداخلية والعلاجية في مجال الطب مفيد لمئات الملايين من الناس كل عام. ومع ذلك، فإن استخدام الإشعاع في مجال الطب يجب أن يوازن بعناية بين فوائد تعزيز صحة الإنسان ورفاهه والمخاطر الكامنة في تعريض الناس للإشعاع.

وتهدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المساعدة على الحد من التعرض غير الضروري وغير المقصود في الواقع العملي من خلال برنامج وأنشطة مكرسة للوقاية من الإشعاعات. ويمكن أن تكون حالات التعرض غير الضرورية هذه نتيجة لإجراءات غير مبررة لتحقيق هدف محدد؛ من تطبيق إجراءات الإشعاع الطبي على الأفراد الذين لا تستدعي حالتهم هذه التدخلات؛ ومن حالات التعرض الطبية غير المحسنة بالشكل المناسب للحالة التي تستخدم فيها. وفيما يتعلق بحالات التعرض غير المقصود، فيمكن أن تكون نتيجة لتصميم غير آمن أو استخدام غير ملائم لتكنولوجيا الإشعاع الطبي. [٢]


### ٣-٣-٣ الجمهور :

المصادر الطبيعية للإشعاع موجودة في جميع أنحاء البيئة. وبوجه عام، يصعب السيطرة على مصادر الإشعاع الطبيعي، ومن المستحيل على الجمهور أن يتجنب تماماً التعرض لها. وفي بعض الحالات الاستثنائية يمكن اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة للحد من حالات التعرض على سبيل المثال استخدام الرادون في المنازل. وبالإضافة إلى الإشعاع الطبيعي، أدى اختبار الأسلحة النووية والحوادث النووية، مثل الحادثتان اللتان وقعتا في تشرنوبل في عام ١٩٨٦ وفوكوشيما في عام ٢٠١١، إلى توليد إشعاع إضافي موجود حالياً في البيئة أيضاً. [٦]

### ٣-٤ طرق الوقاية من الإشعاع الغير مؤين :

تعد الموجات الكهرومغناطيسية من الموجات المحيطة بالجميع لكن بدون لن نشعر في ذلك وامثلتها كثيرة ، لذلك يمكننا الوقاية من التعرض لهذه الموجات من خلال بعض الطرق :

- ١- تعطيل الوظائف الاسلكية : حيث ان الاجهزة الاسلكية تقوم بإصدار موجات كهرومغناطيسية ، مثل الطابعات والاجهزة الوحية وغيرها لذلك يفضل تعطيل الـ Wi-Fi فيها عند استخدامها ، او يمكن اختيار وضع الطائرة لتقليل التعرض الى الاشعاع قدر الإمكان.
- ٢- استبدال الاجهزة اللاسلكية بالاجهزة السلكية : يفضل استخدام الاجهزة السلكية بدلا من اللاسلكية مثل لوح المفاتيح وسماعات الرأس ، والفأرة (الماوس ) وغيرها .
- ٣- الحفاظ على مسافة كافية بين بين مصادر الاشعاع يجب الانتباه الى ابقاء الاجهزة اللاسلكية على مسافة بعيدة عن مكان التواجد ، مثل اجهزة Wi-Fi والاجهزة التي تصدر الاشعاع كما يجب تجنب وضع الهاتف الخليوي في الجيب ، بالإضافة الى ضرورة ابقاء بعيدا عن استخدام الميكروويف ، حيث انه كلما كانت المسافة اكبر كان خطر التعرض الاشعاعي أقل . [١]



الشكل رقم (٣٥) طرق الوقاية من الإشعاع الغير مؤين [١٧]

## الاستنتاجات :

١. تواصل الاهتمام بدراسة الاشعاع وتأثيره نظراً لخطورته
٢. الاشعاع هو عبارة عن طاقة تنطلق على شكل جسيمات صغيرة من مادة ما .
٣. يمكننا استخدام الاشعاع في مختلف المجالات الطبية والصناعية والتجارية.
٤. يقسم الاشعاع الى نوعين رئيسيين تبعا الى طاقته هما الاشعاع المؤين والاشعاع الغير مؤين.
٥. يمتلك الاشعاع المؤين طاقة عالية جدا تساعده على تأين جزيئات الوسط المادي المار فيه.
٦. يمتلك الاشعاع الغير مؤين طاقة قليلة مما يجعله غير مؤين للوسط المادي الذي يمر فيه.
٧. الاشعاع المؤين قاتلا للكائن الحي المتعرض اليه بسبب طاقته العالية مما يجعله سلاحا مميتا على الانسان يتحذر منه.
٨. الاشعاع الغير مؤين ليس مميتا للكائن الحي الاكن فيه اعراض مرضية اخرى يمكن ان يصاب فيها الكائن الحي اثناء تعرضه الى هذه النوع .
٩. يتم الكشف عن الاشعاع عن طريق اجهزة معينة تدعى ب ( الكواشف الاشعاعية)
١٠. مصادر الاشعاع الطبيعية تكون بعيدا عن تدخل الانسان وان اساسها الاشعة الكونية القادمة من الفضاء وبالإضافة الى القشرة الارضية ومصادر اخرى
١١. يحتاج الانسان ان يستعمل الاشعاع في حياته اليومية مثل المجال الطبي او المجال الصناعي فيقوم الانسان بتصنيع الاشعاع الاجل تلك الاغراض .
١٢. اغلب الاجهزة المستخدمة في حياتنا اليومية هي مصادر الاشعاع الغير مؤين ومن ضمن هذه الاجهزة اجهزة Wi-Fi و اجهزة الميكروويف و اجهزة الراديو والتلفزيون
١٣. يمكننا التخلص من الاضرار التي يسببها الاشعاع من خلال نظم الوقاية الصحية . فعند التعامل مع الاشعاع المؤين يمكننا لبس الملابس الواقية للاشعاع وتقليل الفترة الزمنية التعرض
١٤. عن التعامل مع الاشعاع الغير مؤين يمكننا تجنب الآثار التي يسببها هذه الاشعاع من خلال عدم تقريب الاجهزة التي تنتج هذه الاشعاع من الجسم، ايقاف او تعطيل Wi-Fi في اجهزة الموبايل وعدم وضع هذه المنظومات بالقرب من التجمعات.

## المصادر :

١. عمر عذاب الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على الانسان ، مجلة المدار للاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها ، المجلة ٤ الاصدار ٢٠١٢.
٢. صلاح الدين عبد الستار محمد ، التلوث المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي ، مجلة ٣٢ اسبوط الدراسات البيئية، يوليو ٢٠٠٣.
٣. عبد الصمد الحكيمي ، السلامة وطرق التعامل مع الاشعاعات الكهرومغناطيسية ، تقرير مقدم الى وزارة الصحة اليمنية ، ٢٠٠٧.
٤. د. عبد الوالي العجلوني ، الاشعاع والطاقة النووية ، ط ٢ سنة ٢٠٠٣.
٥. محمد فاروق ، الاشعة من حولنا ، ٢٠٠٢.
٦. اجهزة الاستقبال التلفزيونية بواسطة مقاييس الجرعات الحرارية ، مجلة الفيزياء الصحية المجلد ٢٨ ، ١٩٧٥ .
٧. عبد الوالي العجلوني ، الاشعاع والطاقة النووية ، دار مكتبة الحامد النشر والتوزيع ، ٢٠١٠.
٨. محمد قاسم الفخار ، الاشعاع ومصادرة وتأثيراته البيولوجية الطبعة الاولى ٢٠٠٦.
٩. محمد الشرعبي ، كتاب الفيزياء الحديثة ، انواع الاشعاعات ٢٠١٨.
١٠. احمد محمد محمود حاني - التأثيرات الصحية الناجمة عن شبكات التليفون المحمول في التجمعات السكنية - ٢٠٠٥.
١١. نبيل كاظم عبد الصاحب ، الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة الانسان بغداد ٢٠١٢.
١٢. د. عيسى عبد السعداوي ، كتاب الكيمياء البيئية ، نشر بتاريخ ٢٠١٦.
١٣. عبد الكريم حسن، الفيزياء الإشعاعية وتطبيقاتها الطبية، دار المسيرة، ٢٠١١ .
١٤. حسين علي الطائي، التلوث البيئي والإشعاعي، دار اليازوري، ٢٠١٤ .
١٥. أحمد عبد الله السعدي، أساسيات الإشعاع النووي، دار الفكر، ٢٠٠٩ .
١٦. محمود عبد الرحيم، التأثيرات البيولوجية للإشعاع، دار الكتب العلمية، ٢٠١٣ .
١٧. سامي محمد يوسف، التلوث الكهرومغناطيسي في البيئة الحضرية، مجلة العلوم البيئية، ٢٠١٥ .
١٨. عبد الرحمن حسن، الفيزياء الحديثة وتطبيقاتها، دار صفاء للنشر، ٢٠١٧ .
١٩. خالد محمود الزبيدي، الإشعاع والوقاية منه، دار المناهج، ٢٠١٢ .
٢٠. ياسر عبد الكريم، الإشعاعات غير المؤينة وتأثيراتها الصحية، مجلة العلوم التطبيقية، ٢٠١٩.